

Faringan tabletki do ssania 5mg+1,5mg x 20 tabletki ból gardła, stan zapalny



Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Solinea
Substancja czynna	Chlorhexidinum, Benzocainum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Faringan, 5 mg + 1,5 mg tabletki do ssania - 20 tabletek

(Chlorhexidini dihydrochloridum+Benzocainum)

Opis produktu:

Faringan to produkt leczniczy w postaci tabletek do ssania stosowany w zakażeniach bakteryjnych błony śluzowej jamy ustnej oraz gardła

Smak: miętowy

Skład:

- Substancja czynna - chlorheksydyna i benzokaina
- Substancje pomocnicze - izomalt (E 953), makrogol 6000, aromat miętowy (mentol, menton, olejek mięty pieprzowej, maltodekstryna, skrobi oktenylobursztynian sodu (E 1450)), aspartam (E 951), agnezu stearynian

Każda tabletki do ssania zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodoru (Chlorhexidini dihydrochloridum) i 1,5 mg benzokainy (Benzocainum)

Wskazania:

- Lek **Faringan** jest stosowany w leczeniu miejscowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej, zapalenie dziąseł, afty) oraz gardła (zapalenie gardła)

Działanie:

- **chloroheksydyna** wykazuje działanie przeciwbakteryjne
- **benzokaina** działa miejscowo znieczulająco

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat:

- ssać po jednej tabletkie kilka razy na dobę. Jeśli jest taka potrzeba, ssać jedną tabletkę co 1-2 godziny, nie przekraczając 8 tabletek na dobę
- stosowanie leku należy rozpocząć po wystąpieniu pierwszych objawów
- tabletki do ssania należy ssać aż do ich rozpuszczenia się w jamie ustnej. Nie należy połykać ani rozgryzać.
- przez 30 minut po zastosowaniu leku nie zaleca się spożywania pokarmów ani picia.
- lek zaleca się przyjąć co najmniej 30 minut po posiłku i co najmniej 30 minut po umyciu zębów, przed snem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Nie należy stosować leku w przypadku:

- nadwrażliwości na substancje czynne lub którykolwiek ze składników preparatu;
- pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy
- ran i owrzodzeń jamy ustnej i gardła
- małego stężenia cholinioesterazy w osoczu
- dzieci w wieku poniżej 12 lat
- methemoglobinemii

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 osób):

- reakcje alergiczne, miejscowe podrażnienie

Bardzo rzadkie (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- methemoglobinemia (choroba krwi związana z powstaniem nieprawidłowej hemoglobiny), przebarwienie zębów, przebarwienie języka, pieczenie języka, mrowienie języka i (lub) zaburzenia smaku podczas długotrwałego (ponad tydzień) stosowania.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza lub skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala, jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości i (lub) wstrząs anafilaktyczny. Objawami mogą być: wysypka, świąd, omdlenia, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, trudności w połykaniu lub oddychaniu

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować
- należy unikać równoczesnego stosowania leku z innymi lekami stosowanymi miejscowo

Nie stosować leku wraz z:

- innymi lekami zawierającymi substancje bakteriobójcze (np. z sulfonamidami)
- inhibitorami cholinesterazy (lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń poznawczych)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent:

- ma nietolerancję estrowych środków miejscowo znieczulających (zwłaszcza pochodnych kwasu para-aminobenzoesowego (PABA)), parabenów lub p-fenylendiaminy; zmiany nadżerkowe lub złuszczenie w obrębie błony śluzowej jamy ustnej
- Chloroheksydyna zwiększa odkładanie kamienia nazębnego, dlatego podczas stosowania leku zaleca się szczególną dbałość o higienę jamy ustnej i rozważenie stosowania pasty do zębów, zapobiegającej odkładaniu kamienia

Podczas długotrwałego stosowania (dłużej niż 7 dni) leku mogą wystąpić odwracalne przebarwienia zębów oraz powierzchni języka

Dzieci i młodzież:

- nie należy stosować leku Faringan u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Ciąża, karmienie piersią:

-

jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

-

leku Faringan nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Solinea Sp. z o.o. Sp. K. Elizówka 65, Hala I 21-003 Ciecierzyn

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.