

Felogel NEO żel 0,01 g/g 120 g



Cena: 10,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sopharma
Substancja czynna	Diclofenacum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Felogel Neo, 10 mg/ g, żel - 120 g

(Diclofenacum natrium)

Opis produktu:

Felogel Neo zawiera diklofenak należący do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

- Stosuje się go w celu łagodzenia bólu i obrzęków po urazach stawów i ścięgien.

Skład:

Substancją czynną jest: diklofenak

substancje pomocnicze: karbomer 980, makrogol 400, glikol propylenowy, dietanoloamina, sodu benzoesan, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona

Wskazania:

- miejscowe leczenie objawowe pourazowego stanu zapalnego ścięgien, mięśni stawów (np. powstałych wskutek nadwyrężeń, stłuczeń lub skręceń)
- ograniczenie stanów zapalnych tkanek miękkich (np. zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty)

Działanie:

- przeciwbólowe
- przeciwzapalne
- przeciwobrzękowe

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- Żel należy stosować miejscowo na skórę 2 do 3 razy na dobę i dokładnie rozsmarować aż do wchłonięcia przez skórę. Wymagana ilość żelu zależy od wielkości zmienionego obszaru.

Przeznaczony dla dzieci powyżej 14 roku życia i dorosłych

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma uczulenie na diklofenak sodowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, astmę przebiegającą pod postacią napadu, pokrzywkę lub alergiczny nieżyt nosa

Działania niepożądane:

Jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć od 1 do 10 na 100 osób):

- zaczerwienienie, świąd, wysypka, łuszczenie się skóry i suchość skóry

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób):

- nadwrażliwość na światło. - wysypka grudkowa

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- uczucie pieczenia w miejscu podania

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów alergii, należy przerwać stosowanie leku Felogel Neo i natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę:

- pęcherzowe zapalenie skóry: miejscowy obrzęk i pęcherze mogą występować na leczonym obszarze (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób);
- reakcje alergiczne takie jak pokrzywka (mogą dotyczyć 1 na 10 000 osób); duszność, świszczący oddech (astma) (może

dotyczyć do 1 na 10 000 osób); obrzęk twarzy lub gardła (może dotyczyć 1 na 10 000 osób)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Chociaż w przypadku zastosowania leku Felogel Neo na skórę, wystąpienie interakcji z innymi lekami jest mało prawdopodobne, należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne, kortykosteroidy oraz leki na obniżenie ciśnienia krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz gdy pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje dziecko, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty

- należy zachować ostrożność jeśli: pacjent ma wrzód żołądka lub dwunastnicy; niewydolność krążenia (chorobę serca, która może prowadzić do łatwego męczenia się, duszności, obrzęki wokół kostek, itp.);
- pacjent ma problemy z nerkami; u pacjenta występowała nadwrażliwość na pokarmy i leki; pacjent choruje na astmę lub inne choroby uczuleniowe; u pacjenta występowała nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwreumatyczne
- Felogel Neo należy stosować tylko na nieuszkodzoną powierzchnię skóry.
- Należy unikać kontaktu żelu z oczami i błonami śluzowymi, nie połykać.
- W przypadku wystąpienia wysypki należy zaprzestać stosowania.
- Nie należy stosować z opatrunkami nieprzepuszczającymi powietrza

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- Nie należy stosować leku w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią
- Stosowanie leku w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła. Po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Sopharma Warszawa Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.