

Fenistil 1 mg/g, Inpharm, żel, przeciwświądowy, przeciwuczuleniowy, ukąszenia owadów, oparzenia, 30g



Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Dimetindenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Fenistil 1 mg/g, żel - 30 g

Import równoległy Inpharm

(Dimetinden maleas)

Opis produktu:

- Żel Fenistil 1 mg/ml zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy – związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne. Fenistil w żelu wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Skład:

- **Substancja czynna** - dimetyndenu maleinian (Dimetinden maleas)
- **Substancje pomocnicze** - benzalkoniowy chlorek, sodu wersenian, karbomer (karbopol 974 P), sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

1 gram żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu

Wskazania:

Żel Fenistil stosuje się w przypadku wystąpienia:

- świądu towarzyszącego dermatozom,
- pokrzywki,
- ukąszeń owadów,
- oparzeń słonecznych,
- powierzchownych oparzeń skóry (pierwszego stopnia).

Działanie:

Substancja czynna dimetyndenu maleinian hamuje działanie histaminy – związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.

Żel Fenistil stosowany na skórę działa miejscowo:

- przeciwoedematozowo,
przeciwuczuleniowo,
- silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego),
- zmniejsza obrzęk,
łagodzi podrażnienia.

Fenistil w żelu wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
- Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę, pokrywając cienką warstwą żelu zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- W przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Działania niepożądane :

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- Suchość skóry.
- Uczucie pieczenia skóry.
- Skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

- W przypadku stosowania leku Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.
- Należy poinformować lekarza w przypadku bardzo nasilonego świądu lub rozległych zmian.
- Jeżeli po upływie 2 dni stosowania produktu leczniczego u dzieci i 7 dni stosowania produktu leczniczego u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza w przypadku zranień lub stanów zapalnych skóry
- w okresie karmienia piersią nie należy stosować na brodawki sutków

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Należy unikać stosowania u małych dzieci na duże obszary skóry, szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry

Interakcje:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline, Irlandia.

Importer Równoległy:

Inpharm Sp. z o.o., Strumykowa 28/11, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.