

Fenistil 1 mg/ml 20 ml Inpharm



Cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Dimetindenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Fenistil 1 mg/ml krople doustne, roztwór Inpharm - 20 ml

(Dimetindeni maleas)

Import równoległy - InPharm

Kraj eksportu - Irlandia

Opis produktu:

Fenistil to produkt leczniczy o działaniu przeciwalergicznym, stosowanym do łagodzenia świądu i podrażnień towarzyszących wysypce

Fenistil stosuje się również przy katarze i łzawieniu oczu, które towarzyszą alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa

Składniki:

- Substancja czynna - dimetyndenu maleinian (Dimetindeni maleas)
- Substancje pomocnicze - glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas

cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona

1 ml kropli zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu

Wskazania:

Leczenie objawowe chorób alergicznych:

- produkt stosowany jest w leczeniu objawowym alergii pokarmowych oraz polekowych, jak również: łagodzi świąd towarzyszący chorobom zakaźnym (np. ospie).

Może być stosowany w celu łagodzenia objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz w zapobieganiu reakcjom alergicznym występującym podczas leczenia odczulającego.

- skóry: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego,
- układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej nosa sezonowe (katar sienny) i alergiczne

Działanie:

- wykazuje działanie przeciwhistaminowe tj. hamuje działanie histaminy, która jest odpowiedzialna za reakcje alergiczne
- łagodzi świąd i objawy alergii, zmniejsza obrzęk

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

- 20-40 kropli 3 razy na dobę. U pacjentów ze skłonnością do senności należy stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano, podczas śniadania

Dzieci w wieku poniżej 12 lat:

- 2 krople na kg masy ciała na dobę, w 3 dawkach, np:
- 6 kropli 3 razy dziennie w przypadku 8. miesięcznego niemowlęcia ważącego 9 kg
- 8 kropli 3 razy dziennie w przypadku 2. letniego dziecka ważącego 12 kg.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Kiedy nie stosować leku Fenistil:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników tego leku
- noworodki do ukończenia pierwszego miesiąca, szczególnie przedwcześnie urodzone

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10 000 osób):

- trudności w oddychaniu lub przełykaniu
- obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
- zmęczenie
- silny świąd skóry z czerwoną wysypką lub powiększającymi się pęcherzami, skurcze mięśni

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 osoby na 1000 osób stosujących lek):

- pobudzenie
- bóle głowy
- zawroty głowy
- dolegliwości żołądkowo-jelitowe
- nudności
- suchość w jamie ustnej
- suchość w gardle

Często (występują u mniej niż 1 osoby na 10 stosujących lek):

- senność
- nerwowość

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli u pacjenta występują: jaskra, zatrzymanie moczu, padaczka.
- działanie alkoholu może być nasilone przez Fenistil

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Fenistil może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwdepresyjnymi
- lekami rozszerzającymi oskrzela, lekami stosowanymi w stanach skurczowych jamy brzusznej, lekami rozszerzającymi źrenice
- lekami nasennymi i uspokajającymi
- lekami przeciwdrgawkowymi
- opioidowymi lekami przeciwbólowymi
- lekami antyhistaminowymi
- lekami przeciwwymiotnymi
- skopolaminą

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.