


Fenistil żel 1 mg/g żel 30 g PhPoint import



Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka PHARMAPOINT S.A.

Substancja
czynna Dimetindenum

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Fenistil, 1 mg/g żel, 30 g, import

(Dimetindeni maleas)

Import równoległy Medezin

Lek stosowany na skórę działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo

Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - dimetyndenu maleinian (Dimetindeni maleas).
- **Substancje pomocnicze** - benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, karbomer, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

1g żelu zawiera dimetyndenu maleinianu 1 mg

Wskazania:

świąd skóry towarzyszący:

- pokrzywce
- ukąszeniom owadów

- oparzeniom słonecznym
- oparzeniom pierwszego stopnia
- dermatozom

Działanie:

- zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy - związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.
- lek stosowany na skórę działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego)
- zmniejsza obrzęk, łagodzi podrażnienia
- wykazuje miejscowe właściwości znieczulające
- chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- lek jest przeznaczony do stosowania na skórę
- zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę, pokrywając cienką warstwą żelu zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry

Przeciwwskazania:

- nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego
- w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- suchość skóry
- uczucie pieczenia skóry
- skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- w przypadku stosowania leku **Fenistil** na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.
- należy poinformować lekarza w przypadku bardzo nasilnego świądu lub rozległych zmian
- jeżeli po upływie 2 dni stosowania produktu leczniczego u dzieci i 7 dni stosowania u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem

Ciąża i karmienie piersią

- w ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty
- nie należy stosować leku na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza przy jej zranieniach i stanach zapalnych
- w okresie karmienia nie stosować na brodawki sutków.
- kobiety karmiące nie powinny stosować tego leku na skórę piersi, gdyż może on zostać spożyty przez dziecko z mlekiem matki

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Lek Fenistil zawiera glikol propylenowy:

- może powodować podrażnienie skóry.

Lek Fenistil zawiera chlorek benzalkoniowy:

- lek podrażnia, może powodować reakcje skórne.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Na Litwie, w kraju eksportu:

GlaxoSmithKline Irlandia

Importer równoległy:

Medezin Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3 91-342 Łódź

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.