


Flavamed, ułatwia wykrztuszanie, smak malinowy syrop 100ml



Cena: 14,53 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Berlin-chemie
Substancja czynna	Ambroxolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Flavamed, syrop - 100 ml

(Ambroxoli hydrochloridum)

SMAK MALINOWY

Opis produktu:

Flavamed jest produktem leczniczym stosowanym w przypadku kaszlu mokrego

Skład:

- **substancja czynna** - ambroksolu chlorowodorek (Ambroxoli hydrochloridum)
- **substancje pomocnicze** - sorbitol 70% niekrystalizujący kwas benzoesowy, glicerol 85%, hydroksyetyloceluloza, aromat malinowy, woda oczyszczona

Wskazania:

- leczenie mokrego kaszlu związanego z chorobami płuc i oskrzeli

Działanie:

- Ambroksol** zawarty w syropie zwiększa wydzielanie śluzu, zmniejsza jego lepkość i pobudza nabłonek dróg oddechowych do jego usuwania

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 1 do 2 lat:

- 1/2 łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę

Dzieci w wieku od 2 do 5 lat:

- 1/2 łyżki miarowej, tzn. 2,5 ml roztworu doustnego 3 razy na dobę

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

- 1 łyżka miarowa, tzn. 5 ml roztworu doustnego 2 do 3 razy na dobę

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli:

- 2 łyżki miarowe tzn. 5 ml roztworu doustnego 2 do 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, a następnie 2 łyżki miarowe tzn. 5 ml roztworu doustnego 2 razy na dobę

Jeżeli to konieczne, u dorosłych można zwiększyć dawkę do 2 łyżek miarowych każda po 5 ml roztworu doustnego dwa razy na dobę, w celu osiągnięcia lepszego efektu

- bez konsultacji z lekarzem, leku Flavamedu nie należy przyjmować dłużej niż 4 - 5 dni**
- lek przyjmować po posiłku
- nie stosować bezpośrednio przed snem

Przeciwwskazania:

- nie należy stosować w przypadku uczulenia na ambroksolu chlorowodorek lub którykolwiek ze składników tego leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Niezbyt często występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

- wymioty, nudności, bóle brzucha
- obrzęk twarzy
- zaburzenia oddechowe
- gorączka

Rzadko występujące działania niepożądane (nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

- wysypka
- pokrzywka

Częstość nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktyczne), w tym wstrząs anafilaktyczny
- obrzęk twarzy (obrzęk naczynioruchowy)
- świąd i inne reakcje nadwrażliwości

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- w trakcie przyjmowania leku Flavamed nie należy stosować żadnych leków, które hamują odruch kaszlowy (tak zwanych leków przeciwkaszlowych). Odruch kaszlowy jest ważny dla odkrztuszenia upłynnionego śluzu i w ten sposób usunięcia go z płuc.

Dzieci i młodzież:

- Flavamed można stosować u dzieci w wieku od 1 do 2 lat jedynie pod nadzorem lekarza

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- w okresie ciąży i karmienia piersią lek Flavamed można stosować wyłącznie w przypadku wyraźnego zalecenia tego leku przez lekarza. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania leku Flavamed
- zaobserwowano, że substancja czynna zawarta w leku Flavamed przenika do mleka matki. Nie zaleca się stosowania leku Flavamed w okresie karmienia piersią

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła

- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- **okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki : 6 miesięcy**

Podmiot odpowiedzialny:

Berlin-Chemie

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.