

# Flegamax, 50 mg/ml, roztwór doustny, 120 ml



Cena: 20,65 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Carbocisteinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Flegamax, 50mg/ ml, roztwór doustny - 120 ml

(Carbocisteinum)

## Opis produktu:

Flegamax to lek o działaniu rozrzedzającym wydzielinę oskrzelową, co ułatwia jej usuwanie. Lek jest przeznaczony dla dzieci w wieku powyżej 6 lat i osób dorosłych.

## Skład:

- **Substancja czynna** - karbocysteina.
- **Substancje pomocnicze** - sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, aromat malinowy (skład: maltodekstryna (z kukurydzy), skrobia modyfikowana (E 1450), substancje smakowo- zapachowe identyczne z naturalnymi, preparat smakowo- zapachowy), czerwień koszenilowa (E 124), sodu wodorotlenek, karboksymetyloceluloza, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek, 1N roztwór wodny (do ustalenia pH).

Każdy 1 ml roztworu zawiera 50 mg karbocysteiny.

Lek nie zawiera cukru.

## Wskazania:

Syrop Flegamax stosuje się przy objawowym leczeniu chorób układu oddechowego, które przebiegają z nadmiernym wytwarzaniem gęstej i lepkiej wydzieliny.

## Działanie:

- Uplępnia wydzielinę z dróg oddechowych.
- Ułatwienie odkrztuszenia zalegającej wydzieliny.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat** - Początkowo należy stosować dawkę 15 ml leku 3 razy na dobę, a następnie po wystąpieniu działania mukolitycznego (rozrzedzającego wydzielinę), dawkę należy zmniejszyć do 10 ml leku 3 razy na dobę.

**Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat** - 5 ml leku 3 razy na dobę.

- U dzieci i młodzieży dawka dobową karbocysteiny nie może być większa niż 30 mg/kg mc.
- Zaleca się, aby dziecko popiło przyjętą dawkę leku wodą.
- **Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku dłużej niż 4 do 5 dni.**
- W trakcie leczenia należy przyjmować zwiększoną ilość płynów.
- **Nie należy stosować leku przed snem. Ostatnią dawkę należy podać najpóźniej 4 godziny przed snem.**

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

**Kiedy nie stosować leku Flegamax:**

- jeśli pacjent ma uczulenie na karbocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- w stanie astmatycznym.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku Flegamax i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

- **obrzęk naczynioruchowy** (ciężka reakcja alergiczna) z obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy, kończyn,

stawów;

- **zespół Stevensa-Johnsona** (pęcherze przechodzące w nadżerki, na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych).

**Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):**

- ból głowy;
- ból brzucha, biegunka, krwawienia z przewodu pokarmowego, nudności i wymioty;
- skórne reakcje alergiczne, w tym wysypka rumieniowata, świąd, pokrzywka, wysypka polekowa.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podczas stosowania leku Flegamax nie należy stosować leków przeciwkaszlowych ani leków zmniejszających wydzielanie śluzu oskrzelowego.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

**Przed rozpoczęciem stosowania leku Flegamax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:**

- Jeśli u pacjenta występowała w przeszłości choroba wrzodowa.
- W przypadku wystąpienia obfitej ropnej wydzieliny i gorączki, a także w przypadku przewlekłej choroby oskrzeli lub płuc oraz u pacjentów ze zmniejszoną zdolnością do odkrztuszania konieczna jest wizyta u lekarza, który może zalecić inne leki.
- Leczenie pacjentów z astmą oskrzelową powinno przebiegać pod dokładną kontrolą lekarską ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli. W przypadku wystąpienia tego objawu, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

### Dzieci i młodzież:

Flegamax nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

### Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

- Po pierwszym otwarciu butelki lek należy zużyć w ciągu 24 miesięcy.

## Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, .ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.