

Flegatussin, syrop, ułatwia odkrztuszanie, 115ml



Cena: 13,10 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Bromhexinum, Verbascum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Flegatussin, syrop, 115 ml

(Bromhexinum, Verbascum)

Opis produktu:

Flegatussin to produkt leczniczy wskazany w przypadku zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych, stanów zapalnych dróg oddechowych.

Skład:

- **Substancja czynną** jest bromoheksyny chlorowodorek, liść babki lancetowatej, kwiat dziewanny.
- **Substancje pomocnicze:** sacharoza, sodu benzoesan, potasu sorbinian, kwas cytrynowy jednowodny, aromat cytrynowy 0453282, woda oczyszczona.

100 g leku zawiera 0,04 g bromoheksyny chlorowodoru (Bromhexini hydrochloridum), 36 g płynnego wyciągu z liści babki lancetowatej i kwiatów dziewanny (1:3) (Extractum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus).

Wskazania:

- **Flegatussin** zawiera w swoim składzie bromoheksynę, która zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej, upłynnia zalegającą wydzielinę i stymuluje odrzuch wykrztuśny, ułatwia oczyszczanie dróg oddechowych. Wyciągi ziołowe wspomagają leczenie nieżyty dróg oddechowych i łagodzą podrażnienie śluzówki.

Działanie:

- Butamiratu cytrynian wykazuje nieswoiste działanie przeciwocholinergiczne i rozszerzające oskrzela, co ułatwia oddychanie.
- Sinecod nie wywołuje przyzwyczajenia ani uzależnienia.
- Butamiratu cytrynian ma szeroki indeks terapeutyczny: stąd też Sinecod jest dobrze tolerowany.
- Jest stosowany w celu łagodzenia kaszlu u dorosłych i dzieci.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania doustnego.
- Do leku dołączona jest miarka.

Dzieci w wieku 6-12 lat: 3-4 razy dziennie po 5 ml syropu.

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie po 10 ml syropu.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Flegatussin**:

- w przypadku uczulenia na bromoheksynę, liść babki lancetowatej, kwiat dziewanny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane

- bóle i zawroty głowy.

Częstość nieznana:

- nudności, wymioty,
- reakcje alergiczne, np. reakcje skórne,

- skurcz oskrzeli,
- obrzęk naczynioruchowy.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Flegatussin może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeina),
- antybiotykami jak amoksycyklina, cefuroksym, erytromycyna, doksycyklina (zwiększenie stężenia antybiotyku w tkance płucnej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Stosowanie leku może nasilić objawy choroby wrzodowej żołądka.
- W przypadku zdiagnozowanej astmy oskrzelowej, podczas stosowania leku należy zachować szczególną ostrożność.
- Jeśli wystąpią objawy jak: duszność, gorączka, ropna plwocina, należy skonsultować się z lekarzem.
- Osoby z zaburzoną czynnością nerek i wątroby przed zastosowaniem leku powinny skonsultować się z lekarzem - metabolity bromheksyny mogą ulegać kumulacji w zaburzonych narządach.
- Lek zawiera sacharozę - zachować ostrożność stosując lek u cukrzyków.

Stosowanie leku z jedzeniem i pić

- Lek należy przyjmować po posiłku. W czasie kuracji należy przyjmować dużą ilość płynów.

Ciąża i karmienie piersią

- Nie stosować u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.