

Foxill żel ukąszenia świąd oparzenia słoneczne 50g



Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--------------|
| Producent / Marka | Polpharma |
| Substancja czynna | Dimetindenum |
| Typ produktu | |

Opis produktu

Lek bez recepty

Foxill 1 mg/g żel - 50 g

(Dimetinden maleas)

Opis produktu:

Foxill to lek działający łagodząco na zmiany skórne zmniejsza świąd i obrzęk. Stosuje się go w przypadku:

- ukąszeń
- oparzeń (pierwszego stopnia)
- pokrzywce

Skład:

- **Substancja czynna** - dimetyndenu maleinian (Dimetinden maleas)
- **Substancje pomocnicze** - karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona

1 gram żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu

Wskazania:

Foxill stosuje się do łagodzenia świądu towarzyszącego:

- chorobom skóry
- pokrzywce
- ukąszeniom owadów
- oparzeniach słonecznym
- powierzchownym oparzeniach skóry (pierwszego stopnia)

Działanie:

- lek działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęki, łagodzi podrażnienia skóry
- wykazuje miejscowe właściwości znieczulające
- chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty

- lek przeznaczony do stosowania na skórę
- zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Foxill

- jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek składnik tego leku
- w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia

Działania niepożądane :

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- uczucie pieczenia skóry, suchość skóry
- skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- w przypadku stosowania żelu Foxill na rozległą powierzchnię skóry należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych
- należy poinformować lekarza w przypadku bardzo silnego świądu lub rozległych zmian

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- w okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza w przypadku zranień lub stanów zapalnych skóry
- w okresie karmienia piersią nie należy stosować na brodawki sutków

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- należy unikać stosowania u małych dzieci na duże obszary skóry, szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma ul. Pelplińska 19 83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.