

Funtrol lak.dopazn.lecz. 0,05g/ml 2,5ml



Cena: 55,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	ARISTO PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Amorolfinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Funtrol, 50 mg/mL, lakier do paznokci leczniczy, 2,5ml

(Amorolfinum)

Opis:

- Lek Funtrol jest stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci.

Skład:

- Substancją czynną leku jest 50 mg/mL amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg/mL amorolfiny chlorowodoru).
- Pozostałe składniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol, bezwodny

Wskazania:

- Wskazaniem do stosowania leku Funtrol są **grzybice paznokci wywołane dermatofitami (grzybamim bytującymi na skórze, włosach i paznokciach), drożdżakami i pleśniami**. Funtrol jest wskazany w leczeniu grzybicy paznokci nieobejmującej macierzy (miejsce, w którym tworzy się płytka paznokcia) i ograniczonej do 2 paznokci.
- Lek może być stosowany, gdy w wyniku **grzybiczego zakażenia płytki paznokciowej** wystąpiła zmiana koloru płytki paznokcia (przebarwienia koloru białego, żółtego lub brązowego) lub zgrubienie płytki.
- Funtrol jest wskazany do stosowania w przypadku zakażeń grzybiczych obejmujących jedynie górną część płytki paznokciowej. Jeśli infekcja rozprzestrzeni się na inne części płytki paznokciowej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza

Działanie:

- Lek Funtrol zawiera substancję czynną amorolfinę (w postaci chlorowodoru), która należy do grupy leków znanych jako przeciwgrzybicze.
- Lek zabija różnorodne grzyby, które mogą powodować zakażenia paznokci.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku Funtrol jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Lakier do paznokci Funtrol powinno się nakładać na zakażoną powierzchnię paznokcia u rąk lub stóp jeden raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania leczenia

- Ważne jest, aby kontynuować leczenie lekiem Funtrol do czasu pojawienia się w pełni zdrowej płytki paznokciowej, co następuje po około 6 miesiącach w przypadku paznokci rąk i od 9 do 12 miesięcy w przypadku paznokci stóp. Wzrost paznokci jest procesem powolnym, dlatego też pierwsze oznaki poprawy stanu płytki paznokciowej są zazwyczaj widoczne po 2 - 3 miesiącach leczenia.
- Jeśli wygląd płytki paznokciowej nie ulega poprawie, należy zwrócić się do lekarza.
- Ocena przez lekarza skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3-miesięcznych.

Po każdorazowym nałożeniu lakieru Funtrol:

- Należy ostrożnie oczyścić szpatułkę za pomocą nasączonego wacika.
- Szpatułka może być użyta wielokrotnie, jeśli po każdym użyciu została oczyszczona.
- Do oczyszczenia szpatułki można użyć tego samego wacika, którym oczyszczono paznokcie.
- Należy usunąć wszelkie ślady lakieru z zakrętki za pomocą nasączonego wacika.
- Po nałożeniu lakieru należy jak najszybciej szczelnie zamknąć butelkę.

- Należy ostrożnie usunąć wacik, gdyż jest łatwopalny.

Po nałożeniu lakieru i po jego całkowitym wyschnięciu należy umyć dłonie.

Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi należy zakładać nieprzepuszczalne rękawiczki, aby chronić warstwę lakieru Funtról na paznokciach.

Pilniczków używanych do zakażonych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.

Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować leku Funtról u dzieci, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakakolwiek ogólnoustrojowa reakcja alergiczna (poważna reakcja alergiczna, która może być związana z obrzękiem twarzy, ust, języka lub gardła, trudnościami w oddychaniu i (lub) ciężką wysypką na skórze). Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

- **Rzadko (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):** Uszkodzenia paznokci, odbarwienie paznokci, paznokcie łamliwe lub kruche ze skłonnością do rozwarstwiania.
- **Bardzo rzadko** (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): Uczucie pieczenia skóry.
- **Częstość nieznana:** Rumień (zaczerwienienie skóry), świąd, kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka, pęcherze skórne.

Działania niepożądane mogą być również spowodowane rozwojem grzybicy paznokcia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek może powodować reakcje alergiczne i niektóre z nich mogą być poważne. Jeżeli wystąpi reakcja alergiczna, należy bezzwłocznie zaprzestać stosowania leku, natychmiast usunąć go za pomocą wacika nasączonego zmywaczem do paznokci i skonsultować się z lekarzem. Leku nie wolno ponownie nakładać. Jeżeli wystąpi jakikolwiek z następujących objawów, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej:

- trudności w oddychaniu
- obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła
- ciężka wysypka na skórze.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Funtról należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lek Funtról dostanie się do oczu lub uszu, należy je niezwłocznie przepłukać wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

Należy unikać kontaktu lakieru do paznokci z oczami, uszami i błonami śluzowymi (np. ust i nosa).

Nie należy wąchać ani wdychać lakieru.

Lek Funtrol przeznaczony jest wyłącznie do nakładania na płytkę paznokcia. Nie należy nakładać lakieru na skórę wokół paznokcia.

Należy stosować nieprzepuszczalne rękawice ochronne, jeśli pacjent ma kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, co ochroni nałożony lakier leczniczy przed jego rozpuszczeniem.

Stosowanie innych produktów do paznokci

- Nie należy przyklejać sztucznych paznokci podczas stosowania leku Funtrol.
- Można stosować kosmetyczny lakier do paznokci, ale przed jego nałożeniem należy odczekać co najmniej 10 minut po nałożeniu leku Funtrol.
- Przed powtórzną aplikacją leku Funtrol należy usunąć kosmetyczny lakier do paznokci.

Dzieci i młodzież

- Nie należy stosować leku Funtrol u dzieci, z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa

Lek Funtrol zawiera etanol

- Ten lek zawiera 482,53 mg alkoholu (etanolu) w każdym mL lakieru do paznokci. Lek może powodować pieczenie uszkodzonej skóry. Ze względu na obecność etanolu lek jest łatwopalny.
- Nie należy używać go w pobliżu otwartego ognia, zapalonego papierosa lub niektórych urządzeń (np. suszarek do włosów).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- Nie wykazano wpływu leku Funtrol na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie stosować leku Funtrol u kobiet w okresie ciąży lub karmienia piersią, chyba że lekarz uzna, że jest to bezwzględnie konieczne

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie przeprowadzono specjalnych badań dotyczących interakcji leku Funtrol z innymi lekami

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wysoką temperaturą. Przechowywać butelkę w pozycji pionowej szczelnie zamkniętą.
- **Produkt łatwopalny! Roztwór należy przechowywać z dala od ognia i płomieni!**
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Aristo Pharma Sp. z o.o., ul. Baletowa 30, 02-867 Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.