

Gargarin 30g, proszek do sporządzenia roztworu, ból gardła, 30g



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmina
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Gargarin, proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła - 30 g

(Borax + Natrii hydrogenocarbonas + Natrii benzoas)

Opis produktu:

- Lek o działaniu antyseptycznym i miejscowo znieczulającym

Skład:

Substancja czynna: 5 g proszku do sporządzania roztworu do płukania gardła zawiera 1,74 g boraksu,

1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g lewomentolu

- 5 g preparatu zawiera: Tetraboran sodu 1,74 g; wodorowęglan sodu 1,74 g; chlorek sodu 750 mg; benzoesan sodu 750 mg; lewomentol 20 mg.

Wskazania:

- Wskazania: pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Działanie:

- Lek o działaniu antyseptycznym i miejscowo znieczulającym

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- 5 g proszku (1 saszetkę) rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać gardło.
- Czynność powtórzyć 2 do 3 razy na dobę.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach należy poradzić się lekarza.

W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty

Podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

- Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne.
- Nie stosować na uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Brak

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Nie połykać.

- Stosowanie długotrwałe i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się boraksu w organizmie i wywoływać zatrucie.
- Benzoesan sodu po podaniu miejscowym może powodować niewielkiego stopnia podrażnienie oczu, skóry i błon śluzowych.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności

Podmiot odpowiedzialny:

FARMINA, Lipska 44, Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.