

Gastrolit 14 saszetek po 4.15g Teva



Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Gasrolit proszek do sporządzania roztworu 14 saszetek po 4,15 g

Opis produktu:

Gastrolit to proszek, który po rozpuszczeniu stosuje się do zapobiegania i leczenia odwodnienia niewielkiego stopnia, w przebiegu biegunek i wymiotów u niemowląt, dzieci i dorosłych.

Skład:

Jedna saszетка zawiera:

- Sodu chlorek 0,35 g
- Potasu chlorek 0,30 g
- Sodu wodorowęglan 0,50 g
- Nalewka z rumianku 0,02 g
- Glukoza 2,98 g

Po rozpuszczeniu roztwór zawiera: 60 mmol/l Na⁺, 20 mmol/l K⁺, 30 mmol/l HCO₃⁻, 80 mmol/l glukozy.

Osmolalność roztworu powstałego po rozpuszczeniu zawartości saszетки w 200 ml wody wynosi 240 mOsm/kg.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt leczniczy stosuje się doustnie. Przed zastosowaniem, zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml gorącej, przegotowanej wody i ostudzić. W celu przygotowania większej objętości roztworu, np. 500 ml należy rozpuścić 3 saszetki preparatu Gastrolit w 600 ml wody. Z uzyskanego roztworu odmierzyć i dozować odpowiednią objętość zgodnie ze schematem dawkowania.

Do zapobiegania wystąpienia odwodnienia stosuje się:

Osoby dorosłe, młodzież i dzieci powyżej 3 lat:

- 200 ml po płynnym stolcu (co odpowiada roztworowi z 1 saszetki proszku)

Dzieci poniżej 3 lat i niemowlęta:

- Czekając na konsultację lekarską można zastosować 10 ml/kg mc. po każdym stolcu

Dawkowanie w odwodnieniu:

1 saszetkę preparatu Gastrolit należy zawsze rozpuścić w 200 ml gorącej, przegotowanej wody i ostudzić. W celu przygotowania większej objętości roztworu, np. 500 ml należy rozpuścić 3 saszetki preparatu Gastrolit w 600 ml wody. Z uzyskanego roztworu odmierzyć i dozować odpowiednią objętość.

Dorośli:

- pierwsze 4 godziny 500 ml do 1000 ml do zaspokojenia pragnienia, następnie około 200 ml po każdym płynnym stolcu

Młodzież, dzieci starsze:

powyżej 3. roku życia pierwsze 4 godziny 500 ml do zaspokojenia pragnienia, następnie około 100 ml do 200 ml po każdym płynnym stolcu

Dzieci 1-3 lat: (około 10–15 kg)

- pierwsze 4 godziny zwykle 50 ml/kg mc. (500 ml do 750 ml), następnie około 10 ml/kg mc. po każdym płynnym stolcu (100 ml do 150 ml)

Niemowlęta ? 2-12 miesiąca życia (około 5–10 kg) pierwsze 4–6 godzin zwykle 50 do 100 ml/kg mc. (250 ml do 1000 ml), następnie około 10 ml/kg mc. po każdym płynnym stolcu (50 ml do 100 ml)

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gastrolit może być stosowany u kobiet w okresie ciąży oraz karmiących piersią w zalecanych dawkach.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

Lek może być stosowany u niemowląt od 2 miesiąca życia, dzieci i młodzieży.

Wskazania:

Gastrolit po rozpuszczeniu stosuje się do zapobiegania i leczenia odwodnienia niewielkiego stopnia, w przebiegu biegunek, wymiotów, w wyniku gorączki, upałów, intensywnych ćwiczeń, zmniejszonego spożycia płynów, osłabionego pragnienia lub braku uczucia pragnienia

(zwłaszcza u ludzi starszych).

Działanie:

Gastrolit jest preparatem wieloelektrolitowym do nawadniania doustnego.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz w przypadku hiperkaliemii, anurii, ciężkiego odwodnienia, utraty przytomności, szoku hemodynamicznego, niedrożności jelit, obfitych wymiotów, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie występują zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), niekiedy hiperkaliemia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem, sercową niewydolnością krążenia, chorobami wątroby, diabetyków, z zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lek zawiera sód i potas.

Pod opieką lekarza powinny się znaleźć:

- dzieci w wieku poniżej 3 roku życia,
- osoby, u których biegunka trwa dłużej niż 24-48 godzin,
- osoby z chorobą przewlekłą,
- osoby, u których występuje krew w kale,
- osoby, u których występują silne bóle brzucha,
- osoby, u których występują zmiany w stanie psychicznym (np. drażliwość, apatia lub letarg),
- osoby, u których występuje gorączka powyżej 39°C.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na ryzyko hiperkaliemii produktu leczniczego nie należy podawać w skojarzeniu z lekami zwiększającymi stężenie potasu w organizmie (m.in. diuretyki oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny).

Podmiot odpowiedzialny:

TEVA Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., ul. E. Plater 53, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.