

Gastrovit, MultiActiv, niestrawność, zgaga, zaburzenia żołądkowo-jelitowe 100ml



Cena: 15,50 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm Klęka S.A.
Substancja czynna	Productum herbarum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Gastrovit MultiActive - płyn doustny

(Extractum compositum fluidum ex: Artemisiae abrotani herba, Silybi mariani fructu, Menthae piperitae folio, Cnici benedicti herba, Taraxaci radice, Millefolii herba)

WYCIĄG Z 6 ROŚLIN

Opis produktu:

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w niestrawnościach (z objawami zgagi, odbijania, nudności) i zaburzeniach żołądkowo-jelitowych spowodowanych niedostatecznym wydzielaniem soku żołądkowego i żółci

Skład:

Substancja czynna:

- wyciąg złożony płynny (0,67:1) z zieleń bylicy boże drzewko (*Artemisiae abrotani herba*), owocu ostropestu plamistego (*Silybi*

mariani fructu), liścia mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folio*), ziela drapacza lekarskiego (*Cnici benedicti herba*), korzenia mniszka lekarskiego (*Taraxaci radice*), ziela krwawnika (*Millefolii herba*)

100 ml płynu zawiera:

- 100 ml wyciągu złożonego płynnego (*Extractum compositum fluidum*) (0,67:1) z: ziela bylicy boże drzewko (*Artemisiae abrotani herba*), owocu ostropestu plamistego (*Silybi mariani fructu*), liścia mięty pieprzowej (*Menthae piperitae folio*), ziela drapacza lekarskiego (*Cnici benedicti herba*), korzenia mniszka lekarskiego (*Taraxaci radicae*), ziela krwawnika (*Millefolii herba*) (35/15/8/3/3/3), rozpuszczalnik ekstracyjny: etanol 70% (V/V).

Produkt zawiera 60-70% (V/V) etanolu

Wskazania:

- niestrawność
- zgaga
- odbijanie
- nudności
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież od 12 lat:

- przyjmować do 3 razy dziennie przed lub w czasie posiłku po 5 ml preparatu rozcieńczonego w niewielkiej ilości płynu
- lek przeznaczony do doraźnego stosowania

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 14 dni należy skonsultować się z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku Gastrovit MultiActive w przypadku:

- uczulenia na którykolwiek składnik produktu mentol lub rośliny z rodziny astrowatych
- w zapaleniu dróg żółciowych, kamieni żółciowych lub innych schorzeń dróg żółciowych
- w zapaleniu wątroby
- w czynnej chorobie wrzodowej i reflukście żołądkowo-jelitowym

Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn przez co najmniej pół godziny po zastosowaniu, ponieważ produkt może upośledzać sprawność psychofizyczną. Po zastosowaniu leku, alkohol może być wykryty przez urządzenia mierzące jego poziom w powietrzu wydychanym.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka 1 Nowe Miasto nad Wartą

Dodatkowe informacje:

- Dawka jednorazowa leku (5 ml) zawiera 2,95 g etanolu, co odpowiada ok. 30 ml wina lub 70 ml piwa
- Lek szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.