

Gaviscon o smaku mięty 24 tabletki do rozgryzania i żucia



Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Reckitt
Substancja czynna	Natrii alginas, Natrium bicarbonicum, Calcium carbonicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Gaviscon o smaku mięty - 24 tabletki do rozgryzania i żucia

(Natrii alginas 250 mg+Natrii hydrogenocarbonas 133,5 + Calcii carbonas 80 mg)

Opis produktu:

Gaviscon o smaku mięty to produkt leczniczy przeznaczony do leczenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksiem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży albo u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku

Składniki:

- Substancja czynna - alginian sodu, wodorowęglan sodu oraz węglan wapnia
- Substancje pomocnicze - mannitol (E421), makrogol 20 000, kopowidon, aspartam (E951), aromat mięty pieprzowej, magnezu stearynian oraz acesulfam potasowy

1 tabletkę zawiera: 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia

Tabletki nie zawierają cukru ani glutenu

Wskazania:

- **Gaviscon o smaku mięty** jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksiem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku

Działanie:

- tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle oraz jamie ustnej.
- zgaga może pojawiać się po posiłkach (głównie tłustych i ostrych) lub podczas ciąży albo u pacjentów z objawami zapalenia ściany przełyku (np. trudnościami i (lub) utrudnionym przełykaniem, bólem w jamie ustnej, wymiotami)

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek stosować doustnie
- dokładnie przeżuć tabletkę przed połknięciem

Stosowanie u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku oraz u dzieci w wieku 12 lat i powyżej: w przypadku wystąpienia objawów 2 do 4 tabletek po posiłkach i przed snem, do czterech razy na dobę

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje alergiczne na składniki leku (takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- lek zawiera sód (5,3 mmol na dawkę składającą się z dwóch tabletek) i wapno (1,6 mmol na dawkę składającą się z dwóch tabletek)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

- nie należy stosować leku Gaviscon w ciągu dwóch godzin od doustnego zastosowania innych leków, ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków

Ciąża i karmienie piersią:

-

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

-

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Beckinser Poland Sp. z o.o. ul.Okunin 1 Nowy Dwór Mazowiecki

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.