

Gencjana, 0,5%, roztwór wodny na skóry, 20g



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Methylrosanilinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Gencjana 0,5%, roztwór wodny na skórę - 20 g

(Methylrosanilinum)

Opis produktu:

Gencjana 0,5% roztwór wodny to lek, inaczej nazywany Pyoctaniną, używany do odkażania powierzchniowych uszkodzeń naskórka, skóry czy błon śluzowych. Fioletowy roztwór można również stosować do dezynfekcji ropnych zakażeń skóry oraz błon śluzowych. Fiolet gencjanowy przeznaczony jest do stosowania zewnętrznego.

Skład:

Substancją czynną leku jest metylorozanilinowy chlorek.

Substancja pomocnicza: woda oczyszczona.

1 g roztworu zawiera 5 mg metylorozanilinowego chlorku (Methylrosanilini chloridum).

Wskazania:

- Lek stosuje się **zewnętrznie do odkażania powierzchniowych uszkodzeń naskórka, błon śluzowych i skóry, a także ropnych zakażeniach skóry i błon śluzowych, niektórych grzybicach i drożdżycach.**

Działanie:

- Gencjana 0,5% roztwór wodny **działa antyseptycznie, odkażająco.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek należy stosować zewnętrznie, miejscowo na skórę, odkażając miejsca wymagające leczenia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.

- Przeciwwskazaniem do zastosowania produktu leczniczego jest porfiria.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Długotrwałe i częste stosowanie, zwłaszcza u dzieci, może spowodować podrażnienia lub owrzodzenia skóry lub błon śluzowych mających bezpośredni kontakt z produktem.
- Po zastosowaniu metylorozanilinowego chlorku u dzieci w przypadkach pleśniawek błony śluzowej jamy ustnej, odnotowano przypadki wystąpienia zaburzenia akcji oddechowej, związanej z silnym podrażnieniem śluzówek górnych dróg oddechowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Nie stosować do oczu, na rany ziarninujące lub wrzodziejące zmiany w obrębie twarzy.
- Metylorozanilinowy chlorek zabarwia tkanki, plami tkaniny i odzież.
- Plamy z tkanin można usunąć za pomocą mieszaniny etanolu z kwasem octowym

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Gencjana 0,5% może wchodzić w interakcje z substancjami zakwaszającymi lub koloidalnym uwodnionym krzemianem glinu (bentonit).

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny

PPF "Gemi", Grzegorz Nowakowski, Mickiewicza 36, Karczew

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.