

Glimbax 200ml



Cena: 32,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Angelini Pharma
Substancja czynna	Diclofenacum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Glimbax roztwór do płukania jamy ustnej i gardła - 200 ml (Diclofenacum)

Opis produktu:

Glimbax to lek przeznaczony do miejscowego stosowania w postaci roztworu do płukania jamy ustnej i gardła

Skład:

- Substancją czynną leku jest - diklofenak, który zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)
- Substancje pomocnicze - cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesian, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat brzoskwinowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona

1 ml roztworu zawiera diklofenak w postaci kwasu 0,74 mg

Wskazania:

- leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej)
- zapalenie gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego)

Działanie:

- **Glimbax** zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).
- podczas stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę
- każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund
- po użyciu roztwór należy wypluć
- jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Glimbax, należy skontaktować się z lekarzem

Leku Glimbax nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku
- uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny)

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel
- może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- nie są znane oddziaływania tego leku z innymi lekami do stosowania miejscowego w jamie ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- lek Glimbax zawiera sodu benzoesan, który powoduje podrażnienie błon śluzowych
- lek Glimbax zawiera cztery koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- leku Glimbax nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 181B 02-222 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.