

Guajazyl syrop, kaszel mokry 200 g



Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Espefa
Substancja czynna	Guaifenesinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Guajazyl 125mg/5ml syrop - 200 g

(Guaifenesinum)

Opis produktu:

Guajazyl to lek wykrztuśny zmniejsza lepkość wydzieliny z oskrzeli i tchawicy oraz zwiększa jej objętość

Skład:

- substancja czynna: gwajafenezyna (Guaifenesinum)
- substancje pomocnicze: sacharoza, czerwień koszełkowa (E 124), etylu parahydroksybenzoesan, etanol, esencja rumowa spożywcza, powidon, woda oczyszczona

5 ml syropu zawiera 125 mg gwajafenezyny

Wskazania:

- mokry kaszel
- trudności w odkrztuszaniu

Działanie:

- syrop po podaniu doustnym zwiększa objętość wydzieliny śluzowej w oskrzelach i tchawicy, a także zmniejsza jej lepkość
- Guajazyl łagodzi kaszel i ułatwia odkrztuszanie

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Jeżeli lekarz nie zalecił inaczej zazwyczaj stosowana dawka syropu to:

Dzieci od 6 do 12 lat:

- 1 łyżeczka do herbaty (5 ml) syropu 3 do 4 razy na dobę

Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli:

- 1 łyżka stołowa (15 ml) syropu 3 lub 4 razy na dobę

Lek Guajazyl 150 g stosuje się doustnie, po posiłku, popijając niewielką ilością płynu

Nie należy zażywać dwóch dawek jednocześnie. Nie należy stosować podwójnej dawki leku Guajazyl w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

- nie stosować leku Guajazyl u osób z nadwrażliwością na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- przeciwwskazaniem do zastosowania leku jest: niewydolność wątroby, choroba alkoholowa, padaczka, uszkodzenia mózgu, choroby psychiczne - ze względu na zawartość etanolu
- wiek poniżej 6 lat
- niewydolność wątroby
- choroba alkoholowa
- padaczka
- uszkodzenia mózgu
- choroby psychiczne

- ciąża i karmienie piersią

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- 15 ml syropu (1 łyżka stołowa), pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera 562 mg etanolu (alkoholu).
- Etanol wywiera wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości)

Wpływ na badania laboratoryjne:

- produkty metabolizmu gwajafenezyny mogą wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych kwasu 5-hydroksyindolooctowego (5-HIAA) oraz kwasu wanilinomigdałowego (VMA); nie powodują jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych

Działania niepożądane:

Lek Guajazyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należą do nich:

- zaburzenia żołądka i jelit: uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty, biegunka
- zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy, bóle głowy
- zaburzenia układu immunologicznego: wysypka skórna, pokrzywka

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- leku Guajazyl nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, ze względu na zawartość etanolu

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- U osób z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą, chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą, przyjmujących fenylopropanoloaminę, Guajazyl należy stosować ostrożnie

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- chronić przed światłem i wilgocią
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa

- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
- Okres ważności po otwarciu 28 dni

Podmiot odpowiedzialny:

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA ul J. Lea 208 30-133 Kraków

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.