

Gynoxin Optima 200mg, 3 kapsułki dopochwowe, Inpharm



Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

Substancja
czynna Fenticonazolom

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Gynoxin Optima 200 mg, 3 kapsułki dopochwowe

(Fenticonazoli nitras)

Import równoległy - InPharm

Kraj eksportu - Grecja

Gynoxin Optima to lek stosowany w infekcjach intymnych, w grzybiczych i mieszanych zakażeniach. Produkt ma formę kapsułek dopochwowych, zawierających fentikonazol o szerokim zakresie działania w drożdżycy miejsc intymnych oraz mieszanych infekcjach pochwy, ponieważ hamuje rozwój bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych

Skład:

- **substancją czynną jest** - azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras)
- **substancje pomocnicze** - triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, krzemionka koloidalna, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217)

1 kapsułka dopochwowa zawiera 200 mg azotanu fentikonazolu

Wskazania:

- stosuje się w drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych, jak: grzybicze zapalenie pochwy, grzybicze zapalenie sromu, upławy.
- wskazaniem do zastosowania kapsułek dopochwowych jest także leczenie mieszanych zakażeń pochwy. Tego typu infekcje intymne mogą objawiać się silnym świądem okolic intymnych czy bólem w czasie stosunku albo oddawania moczu

Działanie:

- przeciwgrzybicze
- przeciwbakteryjne

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- zalecana dawka to jedna kapsułka dopochwowa miękka stosowana raz na dobę przez trzy kolejne dni
- kapsułkę włóż głęboko do pochwy wieczorem przed snem
- nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

- odczuwanie pieczenia sromu i pochwy, rumień, świąd, wysypka

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nadwrażliwość w miejscu podania

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Leku Gynoxin Optima nie należy stosować jednocześnie z:

- mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi, ponieważ zawiera tłuszcze i oleje, które mogą powodować uszkodzenia środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe).
- nie zaleca się stosowania jednocześnie ze środkami plemnikobójczymi (substancjami stosowanymi dopochwowo, które unieruchamiają plemniki i stosowane są jako antykoncepcja same lub razem np. z diafragmą).
- wszelkie miejscowe leczenie dopochwowe może unieczynnić stosowane miejscowo antykoncepcyjne środki plemnikobójcze

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia
- w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oporności mikroorganizmów na leczenie należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem w celu dalszego leczenia
- w przypadku połknięcia kapsułki dopochwowej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala
- Gynoxin Optima zawiera etylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan sodowy, substancje te mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego)

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- lek Gynoxin Optima powinien być stosowany w ciąży i podczas karmienia piersią pod nadzorem lekarza

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- lek Gynoxin Optima nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci
- należy omówić z lekarzem stosowanie leku jeśli pacjentka nie ukończyła jeszcze 16. roku życia

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Wytwórca:

Catalent Italy S.p.A., Aprilia (LT), Włochy.

Podmiot odpowiedzialny w Grecji, kraju eksportu:

Recordati Hellas Pharmaceuticals A.E., Zoodochou Pigis 7, 152 31 Chalandri, Ateny, Grecja.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.