

Gynoxin Uno, 600 mg, 1 kapsułka dopochwowa Inpharm

Cena: 24,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Inpharm
Substancja czynna	Fenticonazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Gynoxin Uno 600 mg - 1 kapsułka dopochwowe (Fenticonazoli nitras)

Import równoległy - InPharm

Kraj eksportu - Grecja

Opis produktu:

Gynoxin Uno to lek stosowany w infekcjach intymnych, w grzybiczych i mieszanych zakażeniach. Produkt ma formę kapsułek dopochwowych, zawierających fentikonazol o szerokim zakresie działania w drożdżycy miejsc intymnych oraz mieszanych infekcjach pochwy, ponieważ hamuje rozwój bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych

Skład:

- substancją czynną jest - azotan fentikonazolu (Fenticonazoli nitras)
- substancje pomocnicze - parafina ciekła, wazelina biała, lecytyna sojowa, żelatyna, glicerol, tytanu dwutlenek (E 171), etylu

parahydroksybenzoesan (E 215), propylu parahydroksybenzoesan sodowy (E 217)

1 kapsułka dopochwowa zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu

Wskazania:

- stosuje się w drożdżycy błon śluzowych narządów płciowych, jak: grzybicze zapalenie pochwy, grzybicze zapalenie sromu, upławy.
- wskazaniem do zastosowania kapsułek dopochwowych jest także leczenie mieszanych zakażeń pochwy. Tego typu infekcje intymne mogą objawiać się silnym świądem okolic intymnych czy bólem w czasie stosunku albo oddawania moczu

Działanie:

- przeciugrzybicze
- przeciwbakteryjne

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- zalecana dawka to jedna kapsułka dopochwowa miękka stosowana raz na dobę przed snem
- zwykle stosowane dawkowanie u kobiet dorosłych i w wieku powyżej 16 lat
- kapsułkę włóż głęboko do pochwy wieczorem przed snem
- w przypadku, gdy objawy utrzymują się po 1 aplikacji to po 3 dniach można zastosować kolejną kapsułkę dopochwową

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 osoby na 10 000):

- odczuwanie pieczenia sromu i pochwy, rumień, świąd, wysypka

Częstość nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nadwrażliwość w miejscu podania

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Leku Gynoxin Uno nie należy stosować jednocześnie z:

- mechanicznymi środkami antykoncepcyjnymi, ponieważ zawiera tłuszcze i oleje, które mogą powodować uszkodzenia środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu (prezerwatywy, krążki dopochwowe).
- nie zaleca się stosowania jednocześnie ze środkami plemnikobójczymi (substancjami stosowanymi dopochwowo, które unieruchamiają plemniki i stosowane są jako antykoncepcja same lub razem np. z diafragmą).
- wszelkie miejscowe leczenie dopochwowe może unieczynnić stosowane miejscowo antykoncepcyjne środki plemnikobójcze

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- podczas wprowadzania kapsułki do pochwy może wystąpić łagodne, przemijające uczucie pieczenia
- w przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości lub oporności mikroorganizmów na leczenie należy lek odstawić i skontaktować się z lekarzem w celu dalszego leczenia
- w przypadku połknięcia kapsułki dopochwowej należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala
- jeśli partner także został zakażony, to on również powinien poddać się terapii
- stosowane są mechaniczne środki antykoncepcyjne z lateksu - podczas terapii zaleca się inne metody
- pacjentka albo jej partner kiedykolwiek przechodzili chorobę przenoszoną drogą płciową
- kobieta jest uczulona na imidazol albo inne przeciwgrzybicze leki dopochwowe
- u pacjentki wystąpił którykolwiek z objawów: nieprawidłowe lub nieregularne krwawienia, upławy zabarwione krwią, krwawienie z pochwy i (lub) ból w ramionach, rany pochwy i sromu w tym owrzodzenia i pęcherze, ból w dolnej części brzucha, ból pleców oraz ból przy oddawaniu moczu, gorączka ($>38^{\circ}\text{C}$), cuchnące upławy, nudności, działania niepożądane, takie jak: podrażnienie, zaczerwienienie, obrzęk, świąd, wysypka, które są związane z leczeniem

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- nie stosować kapsułek dopochwowych Gynoxin Uno w czasie ciąży i karmienia piersią.
- nie stosować leku u pacjentek w wieku rozrodczym, które nie stosują antykoncepcji

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- lek Gynoxin Uno nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci
- należy omówić z lekarzem stosowanie leku jeśli pacjentka nie ukończyła jeszcze 16. roku życia

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Ireland Ltd. Irlandia

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.