

Hasceral, maść, 50g



Cena: 23,96 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Urea, Acidum salicylicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Hasceral, (100mg+50mg)/g, maść, 50g

(Urea + Acidum salicylicum)

Skład:

Substancjami czynnymi leku są mocznik i kwas salicylowy.

1 g maści zawiera: 100 mg mocznika i 50 mg kwasu salicylowego.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian, samoemulgujący monostearynian glicerolu, glicerol, wazelina biała.

Wskazania:

- Wskazaniami do stosowania produktu Hasceral są choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia – rybia łuska, łuszczyca, łupież czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stóp oraz rogowacenie mieszkowe, ponadto: alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej etiologii.

Działanie:

- Kwas salicylowy w stężeniu 5 % wywołuje złuszczenie komórek naskórka (korneocytów warstwy rogowej). Efekt jego działania jest dwukierunkowy. Polega na redukowaniu przylegania komórek rogowych przez rozpuszczenie substancji międzykomórkowej oraz zmniejszeniu pH w warstwie rogowej, co sprzyja nawodnieniu i zmiękczeniu naskórka. W efekcie dochodzi do utraty

spójności między komórkami, ich oddzielania i złuszczenia.

- **10% mocznik w podłożu maściowym** wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do ścięnięcia warstwy rogowej naskórka i jego złuszczenia. Zmniejszenie spójności keratynocytów i rozmiękczenie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka polega dodatkowo na zwiększaniu jego uwodnienia przez mocznik, co związane jest głównie z zależnymi od niskiej masy cząsteczkowej właściwościami osmotycznymi tego związku. Ponadto mocznik odnawia płaszcz ochronny skóry, co w znaczącym stopniu ogranicza zwrotną utratę wody przez powłoki skórne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na skórę.

- Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dobę.
- Stosować przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy.
- Produkt zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść.

Przeciwwskazania:

- Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Zastosowanie produktu zgodnie z opisanym dawkowaniem i wskazaniem nie wiąże się z istotnym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.
- Niekiedy może wystąpić miejscowe podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hasceral należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

- Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w okolicy oczu i błon śluzowych.
- Nie stosować maści na większe powierzchnie skóry, a jedynie miejscowo.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Ze względu na wchłanianie przez skórę, preparaty zawierające kwas salicylowy nie powinny być stosowane na duże powierzchnie skóry u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Brak danych

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.