

## Hascosept, 1,5 mg/g, aerozol, na ból gardła, po zabiegach, w laryngologii, stomatologii, 30g



Cena: 16,49 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Benzydaminum
Typ produktu	Lek ziołowy

### Opis produktu

## Lek bez recepty

Hascosept 1,5 mg/g, aerozol do stosowania w jamie ustnej - 30 ml

(Benzydaminum)

### Opis:

Roztwór do stosowania w jamie ustnej Hascosept to lek na ból gardła. Produkt leczniczy stosowany w jamie ustnej działa miejscowo znieczulająco i odkażająco.

### Skład:

Substancją czynną jest 0,15 g benzydaminu chlorowodoru.

substancje pomocnicze: błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

100g zawiera 0,15 g benzydaminę chlorowodoru.

## Wskazania:

- Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

## Działanie:

- Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowoderek benzydaminę. Jest to substancja o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt leczniczy do stosowania w jamie ustnej.

**Dzieci poniżej 6 lat** : jedna dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0.14 ml roztworu) od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.

**Dzieci od 6 do 12 lat**: 4 dawki leku od 2 do 6 razy na dobę.

**Młodzież powyżej 12 lat i dorośli**: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.

- Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia.
- Leczenie ciągle nie powinno przekraczać 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.
- Nie stosować dawki większej niż zalecana.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować leku Hascosept w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Rozcieńczenie leku zwykle usuwa te objawy.

- **Działania niepożądane występujące bardzo rzadko** (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów stosujących lek; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty, zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Valused należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).
- Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane oddziaływania leku Hascosept Forte z innymi lekami.

## Ciąża i karmienie piersią:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Lek należy ostrożnie stosować u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

## Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Brak badań dotyczących wpływu leku Hascosept Forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
- Lek zawiera małe ilości etanolu - mniej niż 100mg na dawkę.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, chronić przed światłem,
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

## Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.