

Hascosept, Forte, aerozol, lek, na ból gardła, krtani, 30ml



Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasc-lek
Substancja czynna	Benzydaminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Hascosept Forte, aerozol do stosowania w jamie ustnej - 30 ml

(Benzydaminum)

Opis:

Spray Hascosept Forte to lek w postaci aerozolu stosowany w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. **Działa odkażająco i przeciwbólowo, a dodatkowo zmniejsza obrzęk. Leczy zaczerwienienie oraz zabija wirusy, bakterie i grzyby. Hascosept Forte jest lekiem na ból gardła dla dorosłych.**

Skład:

Substancją czynną benzydaminu chlorowodorek (Benzydaminu hydrochloridum).

substancje pomocnicze: aromat miętowy (AR0960), glicerol (E 422), etanol 96%, sacharyna sodowa (E 954), makrogol glicerolu rycynooleinian, woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 3 mg benzydaminu chlorowodorku.

Wskazania:

Hascosept Forte stosuje się w leczeniu objawów takich jak ból zaczerwienienie, obrzęk, afty związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj:

- w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych,
- w zapaleniu krtani,
- w zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
- w w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.

Działanie:

- Benzydamina zawarta w leku **Hascosept Forte** działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
- Zastosowana miejscowo wykazuje działanie znieczulające i odkażające.
- Benzydamina bardzo dobrze wnika w głąb zmienionych tkanek, ale praktycznie nie wchłania się do krążenia ogólnego.
- Zmniejsza ból i obrzęk towarzyszący stanowi zapalnemu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt leczniczy do stosowania w jamie ustnej.

Dorośli: Spray aplikować od 2 do 6 razy dziennie po 2-4 dawki (jedna dawka zawiera 0,14 ml roztworu)

- Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.
- Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.
- Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przeciwwskazania:

- Kiedy nie stosować leku Hascosept Forte jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) lub o nieznanym częstości (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej,
- suchość w jamie ustnej,

- nudności oraz wymioty,
- reakcje nadwrażliwości,
- reakcja alergiczna (nadwrażliwość),
- zaburzenia czucia, drętwienie,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- wysypka.

Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia. Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólnoustrojowe działania niepożądane występują rzadko.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Valused należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję alergiczną. W takim przypadku lek Hascosept Forte należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza.
- Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) – mniej niż 100 mg na dawkę.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane oddziaływania leku Hascosept Forte z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Lekarz zadecyduje o możliwości stosowania leku u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Brak badań dotyczących wpływu leku Hascosept Forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
- Lek zawiera małe ilości etanolu - mniej niż 100mg na dawkę.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, chronić przed światłem,

- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Pom pierwszym otwarciu butelki lek nadaje się do zużycia przez jeden rok.

Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.