

## Hascovir, control Max, opryszczka 400 mg x 60 tabletek



Cena: 72,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Aciclovirum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Hascovir Control Max 400 mg - 60 tabletek

## (Aciclovirum)

### Opis produktu:

Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej

### Skład:

- Substancja czynna - acyklowir (Aciclovirum)
- Substancje pomocnicze - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian

1 tabletkę zawiera 400 mg acyklowiru

### Wskazania:

- Hascovir control MAX stosuje się w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u osób dorosłych, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej
- lek jest przeznaczony dla pacjentów z prawidłową odpornością

## Działanie:

- działanie Hascoviru control MAX polega na hamowaniu mnożenia się wirusów z grupy Herpes

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek należy stosować doustnie, popijając tabletki wodą.
- dawkowanie Hascoviru control Max u osób dorosłych to 1 tabletka 2 razy dziennie (co 12 godzin)
- bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka)

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

**Kiedy nie stosować leku Hascovir Control:**

- nie stosować leku u osób z nadwrażliwością na acyklowir lub na którykolwiek ze składników tego produktu leczniczego

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Często występujące działania niepożądane (1 do 10 pacjentów na 100):**

- bóle i zawroty głowy
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
- świąd, wysypka
- zmęczenie, gorączka

**Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 do 10 pacjentów 1000):**

- reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów

**Rzadko występujące działania niepożądane (1 do 10 pacjentów 10000):**

- zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie należy stosować leku Hascovir control bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku osób z:

- zaburzeniami nerek lub stosujących leki mogące uszkadzać nerki
- szczególnie ciężką nawrotową opryszczką wargową, częstymi (więcej niż 6 razy w roku) i długotrwałymi (powyżej 5 dni bezefektywnego leczenia) nawrotami opryszczki
- konsultację zaleca się również osobom w podeszłym wieku

**Dzieci i młodzież:**

- leku Hascovir control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

**Ciąża, karmienie piersią:**

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku
- należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu
- lek przenika do mleka kobiecego, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania w okresie karmienia piersią. Lek może być stosowany wówczas jedynie po konsultacji z lekarzem.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Hascovir control MAX może wchodzić w interakcje z probencydem, cymetydyną, jak również mykofenolanem mofetylu

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Hasco-Lek Żmigrodzka 242e Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie

oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

- Hascovir control MAX zawiera laktozę, więc jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, to przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem
- Produkt leczniczy uznaje się za wolny od sodu

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.