

Hederasal, syrop 0,0266 g/5ml , 125 g



Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	WROCLAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Substancja czynna	Hedera helix
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Hederasal 26,6 mg/5 ml, syrop, 125g

(Hederae helicis folii extractum siccum)

Skład:

Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z liścia bluszczu (Hederae helicis folii extractum siccum).

100 g (co odpowiada 81 ml) syropu zawiera: 430,55 mg wyciągu suchego z Hedera helix L, folium (liść bluszczu) (DER 4-8:1),
rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 30% (m/m)

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol (E 420)

1 ml syropu zawiera sorbitol ciekły niekryształizujący – 0,987g

Substancje pomocnicze: Potasu sorbinian, olejek eteryczny anyżowy, glikol propylenowy, sorbitol ciekły niekryształizujący 70%, woda oczyszczona.

Wskazania:

Lek roślinny stosowany jako środek wykrztuśny w przypadku produktywnego (mokrego) kaszlu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Nadwrażliwość na substancję czynną, w tym na rośliny z rodziny araliowatych – Araliaceae lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
- Ze względu na możliwość nasilenia się objawów ze strony układu oddechowego podczas stosowania leków o działaniu sekretolitycznym nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Działanie:

- Wyciąg z liści bluszczu działa wykrztuśnie i rozkurczająco na mięśnie gładkie oskrzeli.
- Zmniejsza częstotliwość oraz bolesność ataków kaszlu. Rozrzedza zalegającą w gardle, krtani i oskrzelach gęstą wydzielinę. Ułatwia odkrztuszanie, łagodzi odruch kaszlowy, nie blokuje odruchów kaszlu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dzieci w wieku od 2 do 5 lat** - od 2 do 3 razy na dobę miarką po 2,5 ml lub po 1 łyżeczki od herbaty.
- **Dzieci w wieku od 6 do 11 lat** - 2 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.
- **Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat** - od 3 do 4 razy na dobę miarką po 5 ml lub po 1 łyżeczce od herbaty.

Sposób podawania:

- Podanie doustne.
- Do opakowania dołączona jest miarka. Syrop przyjmować nierozcieńczony, popić wodą.

Dzieci:

- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Wskazówki dla diabetyków:

- Lek nie zawiera sacharozy. Może być stosowany przez osoby chore na cukrzycę. 1 łyżeczka do herbaty (6,2 g lub 5 ml) syropu zawiera 3,36g Dsorbitolu, co odpowiada 0,28 jednostkom chlebowym (BE).

Czas stosowania:

- Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż tydzień podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: bardzo często (?1/10); często (?1/100 do