

Heel, Engystol, 50 tabletek



Cena: 45,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Heel
Substancja czynna	Homeopathic medicinalis product
Typ produktu	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Homeopatyczny produkt leczniczy

Heel, Engystol - 50 tabletek

Opis produktu:

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Engystol jest lekiem stosowanym wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

Składniki:

Substancje czynne - Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30, Sulfur D4, Sulfur D10.

Substancje pomocnicze - stearynian magnezu, laktoza.

1 tabletkę zawiera:

- Vincetoxicum hirundinaria D6 - 75 mg
- Vincetoxicum hirundinaria D10 - 75 mg

- Vincetoxicum hirundinaria D30 - 75 mg
- Sulfur D4 - 37,5 mg
- Sulfur D10 - 37,5 mg

Wskazania:

- Wspomagająco w infekcjach górnych dróg oddechowych takich jak przeziębienie.

Działanie:

Engystol hamuje namnażanie najpowszechniejszych wirusów powodujących infekcje na:

- wirus grypy typu A o 30%
- wirus paragrypy-3 o 20%
- wirusa infekcji dróg oddechowych (RSV) o 37%
- wirusa przeziębienia (HRV) o 20%
- wirusa opryszczki (HSV-1) o 80%

Ponadto Engystol ogranicza stan zapalny i stymuluje procesy obronne organizmu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni lub nie ustępują, pacjent powinien zasięgnąć porady lekarskiej.
- Dzieciom poniżej 6 roku życia zaleca się podawać lek w formie rozkruszonej i z niewielką ilością wody.
- Dzieci od 4 do 5 roku życia mogą przyjmować połowę tabletki.

Zalecane dawkowanie:

- Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - 1 tabletkę 3 razy dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 roku życia - 1 tabletkę 2 razy dziennie.
- Dzieci od 4 do 5 roku życia - 0,5-1 tabletkę 1-2 razy dziennie po konsultacji z lekarzem.

Dawki maksymalne:

- Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia - 1 tabletkę do 12 razy dziennie.
- Dzieci od 6 do 12 roku życia - 1 tabletkę do 8 razy dziennie.

- Dzieci od 4 do 5 roku życia - 0,5-1 tabletkę do 4 razy dziennie, po konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Lek zawiera laktozę.** Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Podmiot odpowiedzialny:

Heel Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.