


Hemorol x 12 czopków



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol Wrocław
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Hemorol - 12 czopków doodbytniczych

Opis produktu:

Hemorol to czopki doodbytnicze stosowane tradycyjnie przeciw dolegliwościom towarzyszącym żylakom odbytu.

Hemorol jest stosowany także w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej odbytu oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu.

Skład:

- **substancją czynną jest** - wyciąg gęsty z rumianku (*Matricariae extractum spissum*) (3:1) [ekstrahent: woda oczyszczona], wyciąg gęsty z korzenia pokrzyku (*Belladonnae radicis extractum spissum*) (4:1) [ekstrahent: etanol 70% (V/V)], Wyciąg gęsty złożony z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika 80 mg i ziela krwawnika (*Extractum compositum spissum* (4:1) ex: *Cytisi scopariae herba*, *Hippocastani cortice*, *Tormentillae rhizomate*, *Millefolii herba*) [ekstrahent: etanol 40% (V/V)], benzokaina (*Benzocainum*)
- **substancje pomocnicze** - glicerol, tłuszcz stały

1 czopek zawiera:

- 50 mg - wyciągu z rumianku
- 20 mg - wyciągu z pokrzyku

- 80 mg złożonego wyciągu z ziela żarnowca, kory kasztanowca, kłącza pięciornika, ziela krwawnika, 100 mg benzokainy

Wskazania:

- dolegliwości towarzyszące żyłakom odbytu (ból, podrażnienia, stan zapalny),
- stan zapalny błony śluzowej odbytu,
- podrażnienia i pęknięcia śluzówki odbytu.

Działanie:

- zawiera substancje czynne, które odpowiadają za działanie znieczulające (benzokaina), ściągające, przeciwzapalne, rozkurczające i łagodzące ból

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli** - 1 czopek na noc, w cięższych przypadkach 2 do 3 czopków w ciągu dnia.
- Czopki powinny być stosowane do czasu ustąpienia dolegliwości bólowych, jednak nie dłużej niż przez 7 kolejnych dni.
- W przypadku braku poprawy zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nadwrażliwość na benzokainę, rośliny z rodziny Asteraceae (Compositae)
- w przypadku choroby nowotworowej jelita grubego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zaburzenia krwi i układu chłonnego: methemoglobinemia
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne (duszność, choroba Quinckego, zapaść naczyniowa, wstrząs anafilaktyczny)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku wykrycia krwi w stolcu należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadkach dużych guzków krwawniczych, po podaniu czopka (około 5-10 minut) może wystąpić uciskowa bolesność, ustępująca po rozpuszczeniu się czopka.
- W przypadku braku działania lub zaostrzenia objawów chorobowych należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku stosowania miejscowo produktów zawierających benzokainę istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia methemoglobinemii. Objawy methemoglobinemii (błady lub szaroniebieski kolor skóry, warg oraz płytek paznokci, duszność, zmęczenie, bóle i zawroty głowy, przyspieszona praca serca) mogą pojawić się w ciągu kilku minut do jednej lub dwóch godzin po zastosowaniu benzokainy, po podaniu jedno lub wielokrotnym. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża i karmienie piersią:

- Gdy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.
- Ze względu na niebezpieczeństwo wystąpienia działania poronnego wyciągu z ziela żarnowca, Hemorol nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.
- Nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku Hemorol w tym okresie.
- Wpływ na płodność nie jest znany.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Hemorol nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży.
- Nie zaleca się stosowania leku Hemorol w tym okresie karmienia piersią.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Św. Mikołaja 65/68 50-951 Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.