

# Heparin-Hasco Forte, 1000 j.m./g, żel, zapalenie żył, żylaki kończyn, obrzęki, stłuczenia, krwiaki, 35g



Cena: 29,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Heparinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Heparin-Hasco forte, 1000 j.m./g, żel - 35 g

(Heparinum)

## Opis produktu:

Heparin-Hasco forte to produkt leczniczy w postaci żelu na skórę, przeznaczony do **miejscowego leczenia wspomagającego przy chorobach żył powierzchniowych oraz obrzękach, stłuczeniach, krwinkach podskórnych**. Substancja czynna żelu - heparyna- wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, przeciwobrzękowe a także przeciwzapalne..

## Skład:

- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa (Heparinum natricum).

1 g żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej.

- **Pozostałe składniki:** karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, Polisorbat 20, aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

## Wskazania:

- leczenie wspomagające chorób żył powierzchniowych: zapalenie żył, zakrzepowe zapalenie żył, żylaki kończyn dolnych,
- obrzęki, stłuczenia, krwiaki podskórne.

## Działanie:

- 

Heparin-Hasco forte zawiera heparynę, która działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.
- Zalecane dawkowanie: 2 do 3 razy na dobę należy równomiernie rozprowadzić cienką warstwę żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na zmienionym chorobowo miejscu.
- Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

## Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Nie należy stosować leku Heparin-Hasco forte:

- na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę
- ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie, świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować ostrożność u pacjentów ze zdiagnozowaną skazą krwotoczną.
- Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.
- Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy odstawić.
- Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

- **Heparin-Hasco forte** zawiera glikol propylenowy, więc lek może powodować podrażnienie skóry.
- Ze względu na zawartość w **Heparin-Hasco forte** metylu parahydroksybenzoesu i propylu parahydroksybenzoesu, lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

#### Ciąża i karmienie piersią

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
- Heparyna nie przenika przez łożysko, jednak w okresie ciąży i karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności

#### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- **Heparin-Hasco forte** nie należy stosować u dzieci.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Heparin-Hasco forte** może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwzakrzepowymi - tylko u pacjentów chorych na skazę krwotoczną, podczas długotrwałego stosowania na duże powierzchnie skóry, może wtedy nasilić się działanie przeciwzakrzepowe.

## Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e, Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym