

Herpex, 50mg/g, krem przeciw opryszczce, 2 g



Cena: 12,95 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sandoz
Substancja czynna	Aciclovirum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Herpex 50 mg/g, krem przeciw opryszczce - 2 g

(Aciclovirum)

Opis produktu:

Herpex to produkt leczniczy w postaci kremu do stosowania miejscowego na zakażenia skóry wirusem opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV). Krem przeciwwirusowy Herpex jest dostępny bez recepty.

Skład:

- Substancją czynną kremu jest acyklowir (Aciclovirum).

1 g kremu przeciwwirusowego zawiera 50 mg acyklowiru.

- **Pozostałe składniki:** makroglicerydów stearyniany, dimetykon 350, alkohol cetylowy, wazelina biała, parafina ciekła, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Wskazania:

- Herpex to krem przeciwwirusowy dla dzieci i dla dorosłych do stosowania miejscowego w leczeniu zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej Herpes simplex typu 1 i 2. Może być stosowany

miejscowo w leczeniu ospy wietrznej.

Działanie:

- Krem Herpex zawiera substancję czynną acyklowir - lek przeciwwirusowy, który działa silnie na wirusy opryszczki Herpes simplex (HSV) typu 1 i 2 oraz na wirusy ospy wietrznej i półpaśca Varicella-Zoster (VZV).
- Produkt leczniczy Herpex stosowany miejscowo na niewielkiej powierzchni skóry nie ma działania ogólnoustrojowego.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek na opryszczkę Herpex należy nakładać cienką warstwą na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy dziennie co 4 godziny (z przerwą nocną).
- Herpex krem na wirus opryszczki zwykle stosuje się przez 5 dni.
- Lek Herpex należy nakładać na zakażoną powierzchnię skóry i na sąsiadującą powierzchnię za pomocą pałeczki kosmetycznej.
- Jeśli Herpex krem nakłada się palcami, przed nałożeniem i po nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce, aby nie dopuścić do zakażenia (np. bakteriami) zmienionej chorobowo powierzchni skóry, ani do przeniesienia wirusa opryszczki na niezakażoną błonę śluzową i skórę.
- Aby krem przeciwwirusowy był skuteczny, należy zastosować go natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia wirusem opryszczki HSV lub VZV: tj. pieczenia, swędzenia, uczucia napięcia i zaczerwienienia.
- Lek Herpex nie jest skuteczny, gdy zostanie zastosowany w stadium wytworzenia strupów.
- Jeśli po 10 dniach leczenia objawy choroby nie ustąpią, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania:

- Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Herpex na opryszczkę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten powoduje działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

- **Niezbyt często występujące działania niepożądane** (częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów): przemijające uczucie pieczenia lub kłucia; nieznaczne wysuszenie skóry; złuszczenie skóry, świąd.
- **Rzadko występujące działania niepożądane** (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): rumień; kontaktowe zapalenie skóry.
- **Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Leku przeciwwirusowego Herpex nie wolno stosować na błony śluzowe (np. jamy ustnej, oczu lub pochwy), ze względu na możliwość podrażnienia;
- Należy unikać kontaktu kremu z oczami;
- Stosowanie kremu na opryszczkę na narządy płciowe i w okolicy odbytu może zmniejszyć wytrzymałość prezerwatywy z lateksu na rozdarcie;
- Parafina i wazelina zawarte w leku Herpex mogą zmniejszyć bezpieczeństwo stosowania prezerwatyw;
- Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami odporności (np. pacjenci zakażeni wirusem HIV lub po przeszczepieniu szpiku kostnego) przed rozpoczęciem stosowania kremu z acyklowirem na opryszczkę powinni zasięgnąć porady lekarza. Lekarz może zalecić im przyjmowanie acyklowiru w postaci doustnej.
- Herpex lex zawiera glikol propylenowy i alkohol cetylowy: glikol propylenowy może powodować podrażnienia skóry, a alkohol cetylowy może wywołać miejscowe reakcje skórne.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Lek Herpex można stosować w okresie ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść ze stosowania leku przeciwwirusowego w kremie przez matkę przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.
- Acyklowir może przenikać do mleka kobiecego, ale dawka otrzymywana przez niemowlę z pokarmem matki stosującej acyklowir w kremie jest nieznaczna.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować tego leku przeciwwirusowego na opryszczkę u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować: np. innych lekach przeciwwirusowych na opryszczkę i półpasiec, o innych maściach na opryszczkę w nosie, wargową i intymną, również tych dostępnych bez recepty.

- Istotne interakcje z innymi lekami nie są znane.

Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym