

Heviran, Comfort MAX, opryszczka 400mg x 30 tabletek



Cena: 38,40 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Aciclovirum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Heviran Comfort Max 400 mg - 30 tabletek

(Aciclovirum)

Opis produktu:

Zapobieganie nawrotom opryszczki

Skład:

- Substancja czynna - acyklowir (Aciclovirum)
- Substancje pomocnicze - celuloza mikrokrystaliczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

1 tabletko zawiera 400 mg acyklowiru

Wskazania:

- Hascovir control MAX stosuje się w zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u osób dorosłych, u których w przeszłości rozpoznano zakażenie wirusem opryszczki pospolitej
- lek jest przeznaczony dla pacjentów z prawidłową odpornością

Działanie:

- działanie Hascoviru control MAX polega na hamowaniu mnożenia się wirusów z grupy Herpes

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek należy stosować doustnie, popijając tabletki wodą.
- dawkowanie Hascoviru control Max u osób dorosłych to 1 tabletka 2 razy dziennie (co 12 godzin)
- bez konsultacji z lekarzem lek można stosować maksymalnie przez okres 1 miesiąca, szczególnie w okresie narażenia na czynniki wywołujące nawroty opryszczki (np. zwiększona ekspozycja na światło słoneczne, stres, gorączka)

Przeciwwskazania:

Nie stosować Heviranu Comfort Max u osób uczulonych na acyklowir, walacyklowir lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Często występujące działania niepożądane (1 do 10 pacjentów na 100):

- bóle i zawroty głowy
- nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha
- świąd, wysypka
- zmęczenie, gorączka

Niezbyt często występujące działania niepożądane (1 do 10 pacjentów 1000):

- reakcje skórne: pokrzywka, wypadanie włosów

Rzadko występujące działania niepożądane (1 do 10 pacjentów 10000):

- zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Nie należy stosować leku Hascovir control bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem:

- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, stosuje on inne leki, które mogą uszkodzić nerki
- chory jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

- pacjent posiada obniżoną odporność (np. po przeszczepie)
- chory cierpi na szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę wargową
- pacjent zauważył, że opryszka występuje częściej (powyżej 6 w ciągu roku) i trwa dłużej (po 5 dniach terapii brak pozytywnych efektów leczenia) niż dotychczas nawroty, z bardziej, zauważenia nasilonych objawów klinicznych (m.in. gdy po 3-4 dniach terapii powstają nowe ogniska zakażenia)
- Podczas stosowania leku zaleca się spożywanie dużej ilości płynów, co pomoże zapobiec uszkodzeniu nerek

Dzieci i młodzież:

- leku Hascovir control nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku
- należy unikać stosowania leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna, że korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heviran Comfort Max może wchodzić w interakcje z:

- probenecydem,
- cymetydyną,
- mykofenolanem mofetylu,
- teofiliną.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Polpharma Bobrowiecka 6 00-782 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.