

Hirudoid maść 300 mg/100g, urazy z kwiakami, bez krwiaków, zapalenie żył, 100 g



Cena: 54,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Stada
Substancja czynna	Heparinoidum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Hirudoid 03g/100, maść - 100 g

(Mucopolisaccharidum polisulphatum)

Opis produktu:

Preparat zapobiega powstawaniu zakrzepów powierzchniowych, pobudza ich wchłanianie oraz wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, a także przyspiesza wchłanianie krwiaków i obrzęków. Lek Hirudoid w postaci maści stosowany w przypadku tępych urazów z kwiakami lub bez krwiaków

Skład:

- Substancją czynną leku jest mukopolisacharydowy polisiarczan 0,3 g/100 g, co odpowiada 25 000 j.*

100 g żelu zawiera 0,3g/100g mukopolisacharydowego polisiarczanu, co odpowiada 25 000 jednostkom*

*Jednostki ustalone na podstawie oznaczenia częściowego czasu aktywowanej tromboplastyny (APTT).

- Pozostałe składniki to:** glicerol 85%, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu, kwas stearynowy, podłoże maściowe z alkoholami lanoliny, alkohol cetostearylowy emulgujący, alkohol mirystylowy, alkohol izopropylowy, potasu wodorotlenek, tymol, woda oczyszczona.

Wskazania:

Hirudoid stosuje się podczas leczenia:

- tępych urazów z krwinkami lub bez krwinków
- zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym

Działanie:

- Hirudoid wykazuje właściwości przeciwtrombinowe, dzięki czemu przyspiesza wchłanianie krwinków podskórnych
- Lek wykazuje również działanie przeciwzapalne

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Hirudoid maść jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.
- Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej.
- W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm maści.
- Hirudoid w postaci maści należy wmasować w miejsca zmienione chorobowo.
- W przypadku bolesnego zapalenia, maść należy delikatnie rozprowadzić na miejsca chorobowo zmienione.
- Hirudoid maść może być używany jako opatrunek z maści.
- W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni.
- Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Podczas jonoforezy maść jest podawana pod katodę.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku **Hirudoid**:

- jeśli występuje nadwrażliwość (uczulenie) na polisiarczan mukopolisacharydowy, 4-hydroksybenzoesan metylu, 4-hydroksybenzoesan propylu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
- nie należy nakładać maści na otwarte rany i uszkodzoną skórę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek Hirudoid zawiera alkohol cetostearylowy emulgujący
- Lek może powodować miejscową reakcję skóry

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

- Lek można stosować w ciąży i karmienia piersią.

Podmiot odpowiedzialny:

Stada Poland Sp. z o.o. Aleja 3 Maja 6 05-501 Piaseczno

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym