

## Hirudoid, żel, urazy, krwiaki 40g



Cena: 27,95 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Stada
Substancja czynna	Heparinoidum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Hirudoid żel - 40 g

(Mucopolisaccharidum polysulphatum)

### Opis produktu:

Hirudoid to lek w postaci żelu, który stosuje się w urazach (z lub bez krwiaków) oraz zapaleniu żył powierzchownych

Hirudoid można używać także do jono- i fonoforezy

### Skład:

- Substancją czynną jest mukopolisacharydowy polisiarczan (Mucopolisaccharidum polysulphatum)

100 g żelu zawiera 0,3g mukopolisacharydowego polisiarczanu, co odpowiada 25 000 jednostkom\*

\*Jednostki ustalone na podstawie oznaczenia częściowego czasu aktywowanej tromboplastyny (APTT).

- Substancje pomocnicze: sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona

### Wskazania:

Hirudoid stosuje się podczas leczenia:

- tępych urazów z krwinkami lub bez krwinków
- zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym

## Działanie:

- Hirudoid wykazuje właściwości przeciwtrombinowe, dzięki czemu przyspiesza wchłanianie krwinków podskórnych
- Żel wykazuje również działanie przeciwzapalne

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- lek Hirudoid należy **2 do 3 razy na dobę** nakładać i delikatnie wmasować na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza nałożenie od 3 do 5 cm żelu.
- Hirudoid żel jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę
- Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunek.
- Hirudoid może być również stosowany do **fono- i jonoforezy**. Podczas jonoforezy żel jest podawany pod katodę.
- W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył powierzchownych od 1 do 2 tygodni.

## Przeciwwskazania:

- Hirudoid zawiera alkohol izopropylowy, więc należy unikać kontaktu z otwartymi ranami, błonami śluzowymi i oczami
- jeśli pacjent ma uczulenie na mukopolisacharydowy polisaccharan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu na uszkodzoną skórę, otwarte rany, błony śluzowe i oczy

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry, które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- lek Hirudoid zawiera glikol propylenowy
- lek może powodować podrażnienie skóry

## Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

## Podmiot odpowiedzialny:

Stada Poland Sp. z o.o. Aleja 3 Maja 6 05-501 Piaseczno

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym