

Hitaxa Fast junior lek przeciwalergiczny 2,5mg, 10 tabletek



Cena: 14,70 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Adamed
Substancja czynna	Desloratadinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Hitaxa Fast Junior 2,5 mg, 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
(Desloratadinum)

Opis produktu:

Hitaxa Fast Junior produkt leczniczy łagodzący objawy związane z alergicznym zapaleniem błon śluzowych nosa

Skład:

- Substancja czynna - desloratadyna
- Substancje pomocnicze - polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH)

1 tabletkę zawiera 2,5 mg desloratadyny

Wskazania:

- Lek Hitaxa fast junior stosuje się w leczeniu łagodnych objawów związanych z pokrzywką

Działanie:

- **Hitaxa fast junior** łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:

- 1 tabletką ulegającą rozpadowi w jamie ustnej 1 raz na dobę

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 1 raz na dobę

Nie stosować leku **Hitaxa fast junior** dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lub na loratadynę

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10000 pacjentów):

- trudności w oddychaniu
- świszczący oddech
- swędzenie
- pokrzywka i obrzęk
- wysypka
- kołatanie serca
- szybkie bicie serca
- bóle brzucha
- nudności
- wymioty
- rozstrój żołądka

- zawroty głowy
- senność

Częstość nieznana:

- nietypowe zachowanie
- zachowanie agresywne
- zmiany w sposobie bicia serca
- zwiększenie masy ciała
- zwiększony apetyt

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa fast junior należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, bądź występują drgawki
- lek zawiera aspartam, może być szkodliwy dla osób z fenylketonurią

Dzieci i młodzież:

- nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- nie zaleca się stosowania leku **Hitaxa fast junior** w ciąży lub w okresie karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie przypuszcza się, by lek **Hitaxa fast junior** stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. W przypadku wystąpienia powyższych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A. Pieńków, ul. Adamkiewicza 6 05-152 Czosnów

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.