

Hydrokortyzon Hasco Max krem 10 mg/g 15 g



Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Hydrocortisonum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Hydrokortyzon, Hasco, Max, krem, 15g

(Hydrocortisoni acetat 10mg/g)

Lek Hydrokortyzon Hasco Max ma postać kremu przeznaczonego do stosowania miejscowego na skórę

Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - hydrokortyzon (w postaci octanu)
- **Substancje pomocnicze** - makrogolu eter cetostearylowy, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, parafina ciekła, wazelina biała, sorbitanu stearynian, glikol propylenowy (E1520), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216) i woda oczyszczona

1 g kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu octanu

Wskazania:

Lek Hydrokortyzon Hasco Max stosuje się miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy.

Lek stosuje się miejscowo w następujących wskazaniach:

- atopowe zapalenie skóry, wyprysk alergiczny, pokrzywka
- łojotokowe zapalenie skóry
- łagodzenie stanów po ukąszeniu owadów

Działanie:

- działa przeciwzapalnie, przeciwświądowo i obkurcza naczynia krwionośne

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zalecana dawka:

- cienką warstwę kremu nakładać na zmienioną chorobowo skórę 2 lub 3 razy na dobę
- po nałożeniu leku umyć ręce, o ile nie są one objęte leczeniem.
- nie stosować na duże powierzchnie skóry bez uprzedniego porozumienia z lekarzem

Czas trwania leczenia:

- bez porozumienia z lekarzem, nie należy stosować leku dłużej niż przez 7 dni.
- na skórę twarzy nie stosować dłużej niż przez 3 dni.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci:

- u dzieci w wieku poniżej 12 lat nie stosować bez zalecenia lekarza

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez porozumienia z lekarzem. U dzieci lek należy stosować ostrożnie i unikać długotrwałego stosowania, ze względu na większe niż u dorosłych ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych, w tym zaburzeń wzrostu i rozwoju.

Przeciwwskazania:

- jeśli pacjent ma uczulenie na hydrokortyzon, inne kortykosteroidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- w przypadku zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, lub grzybicy układowej
- w trądziku zwykłym lub trądziku różowatym
- jeśli występuje atrofia (zanik) skóry
- w przypadku nowotworu skóry lub stanu przednowotworowego skóry

- w zapaleniu skóry okolicy ust (dermatitis perioralis)
- w zmianach gruzliczych skóry
- na otwarte rany i uszkodzoną skórę

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie kremu z hydrokortyzonem (przez okres dłuższy niż 14 dni), stosowanie na duże powierzchnie skóry, pod opatrunkiem oraz u dzieci, może spowodować wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- zanikowe zapalenie skóry, rozstępy na skórze
- nawrót zakażenia tzw. plamica posteroïdowa (przebarwienia i odbarwienia skóry)
- powierzchowne rozszerzenie naczyń krwionośnych
- trądzik
- zapalenie skóry w okolicy ust
- zapalenie skóry w okolicy oczu
- zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie
- opóźnienie gojenia ran i owrzodzeń
- nadkażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe
- wybroczyny (małe czerwone lub fioletowe plamki na skórze)
- podrażnienie skóry, takie jak pieczenie, zaczerwienienie, nadmierna suchość, alergia kontaktowa
- jaskra lub zaćma - w przypadku stosowania leku na skórę powiek
- nieostre widzenie (może wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów)
- zahamowanie czynności osi podwzgórze - przysadka - nadnercza (nazwa oznaczająca układ współzależnych gruczołów wydzielania wewnętrznego, wytwarzających hormony)
- zwiększone stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)
- występowanie cukru w moczu (cukromocz)
- zahamowanie wzrostu i rozwoju dzieci
- tzw. zespół Cushinga (zaburzenie wzrostu i rozwoju powiązane z wystąpieniem charakterystycznych zmian sylwetki: księżycowata twarz, zaokrąglony tułów i chude kończyny)

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- nie są znane interakcje kremu Hydrokortyzon Hasco Max z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hydrokortyzon Hasco Max należy to omówić z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma cukrzycę - leku nie należy stosować długotrwale
- jeśli pacjent ma jaskrę lub zaćmę, gdyż lek stosowany na powiekę lub na skórę w okolicy powiek może spowodować nasilenie objawów choroby.
- nie należy stosować leku na powiekę lub na skórę w okolicy powiek, ze względu na ryzyko wystąpienia jaskry lub zaćmy.

Podczas stosowania leku Hydrokortyzon Hasco Max należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń:

- nie należy stosować dużych dawek leku, na dużą powierzchnię skóry oraz długotrwale, ponieważ kortykosteroidy wchłaniają się do krwi i mogą spowodować wystąpienie objawów niepożądanych
- jeśli w miejscu stosowania leku Hydrokortyzon Hasco Max wystąpi zakażenie skóry, należy skontaktować się z lekarzem.
- jeśli u pacjenta wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem.
- unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi.
- lek może być stosowany na skórę twarzy oraz na skórę pach i pachwin tylko w przypadkach bezwzględnie koniecznych. Ze względu na znacznie większe wchłanianie leku w tych miejscach istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia działań niepożądanych, nawet po krótkim stosowaniu leku. W takich przypadkach należy porozumieć się z lekarzem.
- stosowanie leku na skórę twarzy dopuszczalne jest tylko przez krótki okres czasu (do 3 dni).
- po nałożeniu leku Hydrokortyzon Hasco Max na skórę nie należy przykrywać tego miejsca żadnym opatrunkiem (zwłaszcza folią czy ceratką), ponieważ nasila to wchłanianie leku.

Ciąża, karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- w okresie ciąży lek może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem, jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, krótkotrwale i na małe powierzchnie skóry. Szczególnie ostrożnie stosować w pierwszych 3 miesiącach ciąży.
- W okresie karmienia piersią lek może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z lekarzem. Nie wiadomo czy stosowane miejscowo kortykosteroidy przenikają do mleka kobiecego, dlatego lek należy stosować ostrożnie, krótkotrwale i na małą powierzchnię skóry. Leku nie należy nakładać na skórę piersi bezpośrednio przed karmieniem piersią.

Lek Hydrokortyzon Hasco Max zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), alkohol cetylowy, alkohol stearylowy oraz glikol propylenowy (E 1520)

- ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje

alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

- ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego lek może powodować miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).
- lek zawiera 30 mg glikolu propylenowego w 1 g kremu.
- glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
- Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.