

Hydrovag, hialuronian sodu, kwas mlekowy x 7 globulek dopochwowych



Cena: 35,94 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Biomed
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Hydrovag - 7 globulek dopochwowych

Opis produktu:

Globulki dopochwowe HydroVag to wyrób medyczny opracowany specjalnie dla kobiet

Skład:

Składniki aktywne:

- **hialuronian sodu** - chroni i nawilża śluzówkę pochwy oraz wspiera proces gojenia i odbudowy tkanek
- **kwas mlekowy** - wspomaga utrzymanie właściwego pH pochwy, co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji
- **glikogen** - jest składnikiem odżywczym dla pałeczek kwasu mlekowego oraz pełni funkcję barierową

1 globulka zawiera: hialuronian sodu 10 mg, kwas mlekowy, glikogen, mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne

Wskazania:

- łagodzenie uczucia suchości i dyskomfortu (pieczenie, świąd, napięcie) okolic intymnych

- łagodzenie bólu w przypadku bolesnych stosunków (dyspareunia) oraz dyskomfortu związanego z obrzękiem, zaczerwienieniem, swiędem okolic sromu oraz pojawieniem się nieprawidłowej wydzieliny
- ułatwienie regeneracji nabłonka pochwy (w okresie okołomenopauzalnym, po porodzie, po zabiegach ginekologicznych, po radio- i chemioterapii)
- utrzymanie prawidłowej flory i pH pochwy, wspomagająco po kuracji antybiotykami.

Działanie:

- poprawiają stan nawilżenia śluzówki pochwy i wspierają procesy regeneracyjne
- pomagają utrzymać fizjologiczne pH oraz zapewniają ochronę przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych
- umieszczona w pochwie globulka HydroVag ulega stopniowemu rozpadowi, pozostawiając na błonie śluzowej warstwę powlekającą, która pomaga przywrócić prawidłowy stan nabłonka pochwy

Sposób użycia:

Kuracja podstawowa:

- stosować 1 globulkę dopochwową na noc przez 7 kolejnych dni lub według wskazań lekarza

Kuracja podtrzymująca:

- stosować 1 globulkę dopochwową na noc co 2-3 dni do uzyskania trwałej poprawy lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
- W przypadku uzupełnienia kuracji podstawowej kuracją podtrzymującą łączny czas terapii może trwać do 30 dni. Następnie należy zrobić 7-dniową przerwę.
- W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć kolejną. Nie należy stosować 2 dawek preparatu jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu

Jak prawidłowo aplikować globulkę dopochwową HydroVag

- przystępując do aplikacji globulki, dokładnie umyj ręce
- jeśli na skutek działania wysokiej temperatury konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem w folii włóż ją do lodówki na kilka minut
- następnie oderwij jedno gniazdo z blistra. W tym celu rozchyl listki folii i łagodnym ruchem rozdziel je od siebie.
- ostrożnie wyjmij globulkę i delikatnie umieść ją głęboko w pochwie. W celu ułatwienia aplikacji globulkę możesz zwilżyć ciepłą przegotowaną wodą.

Przeciwwskazania:

- nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu
- w przypadku ostrych infekcji pochwy zalecane jest stosowanie globulek pod nadzorem lekarza

- nie stosować w trakcie menstruacji
- bezpośrednio po aplikacji globulki nie podejmować współżycia płciowego
- nie stosować łącznie z prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi wykonanymi z lateksu ze względu na obecność w składzie preparatu modyfikowanych tłuszczów
- nie stosować w przypadku uszkodzenia blistra
- nie połykać
- każdą globulkę należy stosować jednorazowo
- w celu zabezpieczenia bielizny przed ewentualnym zabrudzeniem w trakcie kuracji należy stosować wkładki higieniczne

Przechowywanie:

- przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci
- przechowywać w temperaturze 5-25oC w suchym miejscu
- chronić przed światłem i wysoką temperaturą

Ważne:

- Posiada oznakowanie **CE 0197**
- Posiada deklarację zgodności **UE**.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.