

Iberogast płyn doustny 20 ml Inpharm

Cena: 33,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	INPHARM SP. Z O.O.
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Iberogast 9 wyciągów roślinnych, płyn doustny, 20 ml

Import równoległy InPharm

Iberogast to produkt leczniczy roślinny do stosowania w przypadku różnych dolegliwości przewodu pokarmowego.

Wskazania:

- do stosowania w leczeniu zaburzeń czynnościowych (żołądkowo-jelitowych) związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa (niestrawność) czy zespół jelita nadwrażliwego.
- dolegliwości skurczowe jamy brzusznej i jelit, ból brzucha, uczucie pełności, wzdęcia, nudności i zgaga

Działanie:

- łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit.
- wykazuje właściwości przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne

Skład:

100 ml płynu zawiera:

- **Iberis amara herbae extractum** (wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego) ekstrahent - etanol 50% (v/v) (1: 1,5 - 2,5) - 15 ml
- **Angelicae radice extractum** (wyciąg z korzenia arcydzięgla) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 10 ml
- **Matricariae flos extractum** (wyciąg z kwiatu rumianku) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2 - 4) - 20 ml
- **Carvi fructus extractum** (wyciąg z owocu kminku) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 10 ml
- **Silybi mariani fructus extractum** (wyciąg z owocu ostropestu) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 10 ml
- **Melissae folii extractum** (wyciąg z liści melisy) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 10 ml
- **Menthae piperitae folii extractum** (wyciąg z liści mięty pieprzowej) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 5 ml
- **Chelidonii herbae extractum** (wyciąg z ziela glistnika) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 10 ml
- **Liquiritiae radice extractum** (wyciąg z korzenia lukrecji) ekstrahent - etanol 30% (v/v) (1: 2,5 - 3,5) - 10 ml

Lek Iberogast zawiera 29,5 - 32,6 % (v/v) etanolu

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się w niewielkiej ilości płynu przed lub w czasie posiłków.

Zalecana dawka leku to:

- **dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 3 razy na dobę po 20 kropli
- **dzieci w wieku od 6 do 12 lat:** 3 razy na dobę po 15 kropli
- **dzieci w wieku poniżej 6 lat:** nie zaleca się stosowania

Podczas dozowania trzymać butelkę z kroplomierzem pod kątem 45°. Po użyciu szczelnie zamknąć zieloną zakrętką

Podanie doustne

Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny

Wstrząsnąć przed użyciem

Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu Iberogast

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku.

- Jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które - według ulotki dla pacjenta - mogą powodować działania niepożądane w postaci uszkodzenia wątroby. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Nie zaleca się podawania dzieciom w wieku poniżej 6 lat.
- U dzieci w wieku poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000): mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność.

Częstość nieznaną: występowały przypadki uszkodzenia wątroby (zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby, żółtaczka polekowa, zapalenie wątroby i niewydolność wątroby); w razie wystąpienia takich objawów, jak zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz i odbarwiony stolec, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Iberogast i zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca, ból w nadbrzuszu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Iberogast i skonsultować się z lekarzem. Mogą to być objawy uszkodzenia wątroby.
- Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast
- Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką, powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży albo planuje dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Iberogast w okresie ciąży.

Stosowanie z innymi lekami:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Interakcje nie są znane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera do 240 mg alkoholu (etanol). Jeśli lek Iberogast stosowany jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn
- Lek Iberogast zawiera etanol (alkohol) w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Jednorazowa dawka leku dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
- Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni

Podmiot odpowiedzialny w kraju eksportu:

Bayer Bulgaria EOOD Sofia

Wytwórca:

Steigerwald Darmstadt Niemcy

Import równoległy:

InPharm Sp. z o.o. ul. Strumykowa 28/11 03-138 Warszawa

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.