

Ibum Forte, 200 mg/5 ml, zawiesina, smak truskawkowy, 100g



Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ibum forte 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku truskawkowym, 100 g

(Ibuprofenum)

Opis produktu:

Ibum Forte to produkt leczniczy w postaci syropu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

Skład:

Substancją czynną leku jest: ibuprofen. 5 ml zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat truskawkowy naturalny AR, 215 (zawiera naturalnesubstancje aromatyczne oraz glikol propylenowy E 1520), woda oczyszczona.

Działanie:

- Lek **Ibum Forte** łagodzi dolegliwości bólowe i gorączkowe.

Wskazania:

- gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczipiennego.
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.
- Lek **Ibum Forte** jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Dawka dobowa produktu jest ściśle uzależniona od masy ciała.

- **Dzieci w wieku 3-6 miesięcy (5-7,6 kg):** 1,25 ml, maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 6-12 miesięcy (7,7-9 kg):** 1,25 ml, maksymalnie 3-4 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 1-3 lat (10-15 kg):** 2,5 ml, maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 4-6 lat (16-20 kg):** 3,75 ml, maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 7-9 lat (21-29 kg):** 5 ml, maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci w wieku 10-12 lat (30-40 kg):** 7,5 ml, maksymalnie 3 razy na dobę.
- **Dzieci powyżej 40 kg:** 7,5-10 ml, maksymalnie 3-4 razy po 7,5 ml na dobę.

Lek należy podawać w odstępach co najmniej 6-godzinnych. U niemowląt poniżej 6 miesiąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem. Nie można stosować większej dawki niż zalecana. Nie stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Ibum forte**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 100):

- zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

- zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
- bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,
- zaburzenia widzenia,
- wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać,
- owrzodzenie jamy ustnej lub obrzęk i podrażnienie ust,
- reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10000):

- szумы uszne (dzwonienie w uszach).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 pacjenta na 10000):

- zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit,
- ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęchrze,
- zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle,
- problemy dotyczące wytwarzania krwinek,
- reakcje psychiatryczne i depresja,
- zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby.

Częstość nieznaną:

- mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibum Forte i innych NLPZ,
- Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwplatekcyjne,
- Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy,

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC,
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ibum® Forte może mieć wpływ na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku:

- kortykosteroidy (np. prednizolon), ponieważ mogą one zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
- leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2, takie jak celekoksyb lub etorykoksyb),
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna),
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak captopril, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan),
- leki przeciwplatekcyjne (takie jak kwas acetylosalicylowy) i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki przeciwdepresyjne), ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego,
- leki stosowane w nadciśnieniu krwi i leki moczopędne, ponieważ leki z grupy NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków i istnieje możliwość zwiększenia ryzyka uszkodzenia nerek. W takim przypadku ważne by dziecko piło duże ilości płynów w ciągu dnia,
- lit (lek stosowany w depresji), ponieważ może zwiększać się działanie litu,
- metotreksat (lek stosowany w leczeniu chorób nowotworowych lub chorób reumatycznych), ponieważ może zwiększać się działanie metotreksatu,
- takrolimus (lek hamujący reakcje immunologiczne), ponieważ zwiększone jest ryzyko toksycznego działania na nerki,
- cyklosporyna (lek hamujący reakcje odpornościowe), ponieważ istnieją ograniczone dane dotyczące zwiększonego ryzyka toksycznego działania na nerki,
- zydowudyna (lek stosowany w leczeniu AIDS), ponieważ stosowanie leku Ibum® Forte może prowadzić do zwiększenia ryzyka krwawienia do stawów lub krwawienia, które prowadzi do obrzęków (u pacjentów z hemofilią z pozytywnym wynikiem testu na obecność przeciwciał HIV),
- pochodne sulfonilomocznika (leki przeciwcukrzycowe): mogą wystąpić oddziaływania kliniczne między tymi lekami a lekami z grupy NLPZ. Zalecana jest kontrola stężenia glukozy we krwi,
- probenecyd i sulfipirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej): mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu,
- glikozydy naparstnicy, fenytoina i lit: ibuprofen może zwiększyć stężenie tych leków w osoczu,
- antybiotyki z grupy chinolonów: mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek,
- cholestyramina: może opóźniać i zmniejszać wchłanianie leków z grupy NLPZ,
- worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybiczne): mogą zwiększać narażenie na leki z grupy NLPZ.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
- u odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Okres przechowywania po pierwszym otwarciu to 6 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny:

Hasco-Lek ul. Żmigrodzka 242E 51-131 Wrocław.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.