

## Ibum Forte syrop malinowy 100ml zawiesina doustna



Cena: 26,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

## Ibum forte 200 mg/5 ml zawiesina doustna o smaku malinowym 100 g

(Ibuprofenum)

### Opis produktu:

Ibum Forte to produkt leczniczy w postaci syropu o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym.

### Skład:

Substancją czynną leku jest: ibuprofen. 5 ml zawiera 200 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze: maltitol ciekły, glicerol, guma ksantan, sacharyna sodowa, sodu benzoesan, kwas fumarowy, disodu fosforan dwunastowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona.

### Działanie:

Lek **Ibum Forte** łagodzi dolegliwości bólowe i gorączkowe.

## Wskazania:

- gorączka różnego pochodzenia, między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego.
- bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego.
- Lek **Ibum Forte** jest przeznaczony do krótkotrwałego leczenia objawowego:

## Dawkowanie:

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub wg zaleceń lekarza lub farmaceuty.

## Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku **Ibum forte**:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, perforacją lub krwawieniem, również występującymi po zastosowaniu NLPZ,
- u pacjentów, u których w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi występowały w przeszłości jakiegokolwiek objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki, duszności lub astmy oskrzelowej,
- jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca,
- jeśli występuje krwawienie w mózgu lub inne krwawienie,
- jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, skaza krwotoczna lub zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu,
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 pacjentów na 100):

- zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia.

**Niezbyt często występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 pacjentów na 1000):

- zapalenie żołądka, jelita grubego i nasilenie choroby Crohna (zapalna choroba jelit),
- bóle głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie,

- zaburzenia widzenia,
- wrzody żołądka, które mogą krwawić lub pękać,
- owrzodzenie jamy ustnej lub obrzęk i podrażnienie ust,
- reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, ataki astmy.

**Rzadko występujące działania niepożądane** (u 1 do 10 pacjentów na 10000):

- szумы uszne (dzwonienie w uszach).

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (u mniej niż 1 pacjenta na 10000):

- zapalenie przełyku lub trzustki, niedrożność jelit,
- ciężkie reakcje skórne, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęchrze,
- zmniejszone oddawanie moczu niż zwykle,
- problemy dotyczące wytwarzania krwinek,
- reakcje psychotyczne i depresja,
- zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby.

**Częstość nieznaną:**

- mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ibum Forte i innych NLPZ,
- Podczas stosowania innych leków, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia, takich jak doustne kortykosteroidy, leki rozrzedzające krew, selektywne inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwplatekcyjne,
- Termin ważności po pierwszym użyciu: 6 miesięcy,
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C,
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Stosowanie innych leków:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Interakcje:**

Ibum Forte może wchodzić w interakcje z:

- lekami o działaniu przeciwzakrzepowymi,
- lekami obniżającymi ciśnienie krwi.

## Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia lek można podawać tylko po konsultacji z lekarzem.
- u odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

## Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Okres przechowywania po pierwszym otwarciu to 6 miesięcy.

## Podmiot odpowiedzialny:

Hasco-Lek ul. Żmigrodzka 242E 51-131 Wrocław

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.