

Ibument, żel, 50 mg/g+30 mg/g, ból, obrzęk, urazy, skręcenia, stawów, kontuzje sportowe, 100 g



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Ziaja
Substancja czynna	Ibuprofenum, Levomentholum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ibument (50 mg+30 mg)/g żel - 100 g, Ziaja

(Ibuprofenum, Levomentholum)

Opis produktu:

Żel Ibument to żel zawierający dwie substancje czynne ibuprofen o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym oraz lewomentol o działaniu miejscowo znieczulającym. Przeznaczony dla dzieci powyżej 12 roku życia i dorosłych.

Skład:

- Substancjami czynnymi są: ibuprofen (Ibuprofenum) + lewomentol (Levomentholum).
- Substancje pomocnicze: etanol 96%, karbomer 980, glikol propylenowy (E 1520), diizopropanolamina 85%, woda oczyszczona.

1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu (Ibuprofenum) i 30 mg lewomentolu (Levomentholum).

Wskazania:

- Ibument to żel przeznaczony do leczenia: bólu i obrzęków wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręceń stawów), kontuzji sportowych; bólów reumatycznych, w tym bólu stawów spowodowanych zmianami

zapalnymi i zwyrodnieniowymi; bólu pleców, lumbago, bólów mięśniowych, bólów w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach.

Działanie:

- Żel Ibument jest lekiem o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Wywiera skojarzone działanie zawartych w nim substancji czynnych: ibuprofenu i lewomentolu. **Ibuprofen (niesteroidowy lek przeciwzapalny), którego działanie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn, wykazuje właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jednocześnie lewomentol zawarty w leku wywołuje uczucie chłodu w miejscu zastosowania oraz działa lekko znieczulająco.**

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się miejscowo na skórę.

Zalecana dawka:

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Żel nałożyć na bolące miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia leku.
- Należy jednorazowo stosować od 1 do 4 cm żelu.
- W razie konieczności powtarzać, maksymalnie do 3 razy na dobę.
- Nie stosować żelu częściej niż co 4 godziny.
- Po użyciu żelu należy umyć ręce, chyba że są one miejscem leczonym.
- Nie przykrywać opatrunkami, takimi jak bandaże czy plastry, miejsc nałożenia żelu.
- Maksymalny czas trwania leczenia to dwa tygodnie.
- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma astmę i w przeszłości miał występujące napady duszności, pokrzywkę, nieżyt błony śluzowej nosa po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Działania niepożądane zgłaszane najczęściej:** zaczerwienienia, świąd, pokrzywka.
- **Działania niepożądane zgłaszane rzadko:** zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak ból brzucha i niestrawność.

U osób predysponowanych, u których występują lub występowały napady astmy lub choroby alergiczne, może wystąpić skurcz oskrzeli.

- **Częstość nieznana:** skóra staje się wrażliwa na światło.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Należy zachować ostrożność jeśli pacjent stosuje inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą wchodzić w interakcje z lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi, chociaż możliwość takich interakcji z lekami stosowanymi miejscowo jest bardzo mała. Podczas jednoczesnego stosowania leku z kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych charakterystycznych dla tej grupy leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować ostrożność jeśli pacjent choruje na chorobę wrzodową (żołądka i/lub dwunastnicy), niewydolność nerek lub wątroby.
- Należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Produktu leczniczego nie należy stosować na skórę uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym. W przypadku wystąpienia wysypki należy odstawić produkt leczniczy.
- Należy zachować ostrożność podczas podawania produktu leczniczego i jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Nie zaleca się stosowania leku Ibument u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 12 lat bez zaleceń lekarza.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

- Lek przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Ziaja, Zakład Produkcji Leków, Jesienna, 9, Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.