

Ibuprex Max, ibuprofen, 400, lek, przeciwbólowy, przeciwzapalny, przeciwgorączkowy, 12 tab.

Cena: 8,99 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Olimp
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ibuprex Max, 400 mg - 12 tabletek powlekanych

(Ibuprofenum)

Opis produktu:

Tabletki powlekane Ibuprex Max to lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i przeciwzapalny. Lek zawiera ibuprofen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i stosuje się go w łagodnych oraz umiarkowanych bólach różnego pochodzenia, np. bólach głowy, zębów, menstruacyjnych czy lędźwiowo-krzyżowych. Ibuprex Max można stosować również w leczeniu gorączki, towarzyszącej przeziębieniu albo grypie czy innym chorobom zakaźnym.

Skład:

- Substancją czynną leku jest ibuprofen (Ibuprofenum)
- **Substancje pomocnicze:** rdzeń tabletki – celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 5 cP, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, woda oczyszczona, makrogol 6000, sodu stearylofumarany; otoczka Opadry 200 White (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu węglan).
- 1 tabletkę powlekaną zawiera 400 mg ibuprofenu.

Wskazania:

- Wskazaniem do zastosowania leku jest ból o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym oraz gorączka.
- Ibuprex Max stosuje się między innymi: bólu głowy, migrenie, bolesnym miesiączkowaniu, bólu kości, mięśni i stawów (także w wyniku urazów), bólu zębów, bólu okolicy lędźwiowo-krzyżowej oraz leczeniu gorączki, która towarzyszy np. zakażeniom górnych dróg oddechowych, przeziębieniu i grypy lub innym chorobom zakaźnym.

Działanie:

- Ibuprex Max działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo oraz przeciwzapalnie.
- Lek zawiera ibuprofen z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek stosuje się doustnie, popijając tabletkę szklanką wody.
- Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku dłużej niż 3 dni w gorączce, a w przypadku bólu maksymalnie 4 dni.
- Młodzieży nie podawać leku dłużej niż przez 3 dni lub jeśli objawy nasilają się to skontaktować się z lekarzem.

Leczenie gorączki i bólu (w tym bólu głowy, migreny, bólu zębów, bólu kości, mięśni i stawów, bólu pleców)

Dawkowanie dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat :

- 1 tabletkę powlekana do 3 razy dziennie w 4–6 godzinowym odstępiech.
- Maksymalna dawka dobową to 3 tabletki powlekane.

Bolesne miesiączkowanie

Dawkowanie dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat :

- 1 tabletkę powlekana, stosowanie do potrzeb od 1 do 3 razy dziennie z 4–6 godzinnym odstępiech .
- Maksymalna dawka dobową to 3 tabletki powlekane.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazaniem do zastosowania Ibuprex Max jest nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek ze składników leku. Nie stosować u pacjentów, których dotyczyły lub dotyczą 1 lub więcej z wymienionych stanów: duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ); choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy; krwawienie albo perforacja przewodu pokarmowego po NLPZ, ciężka niewydolność wątroby, nerek, serca, choroba wieńcowa, niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego, krwawienie, ciężkie odwodnienie.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- **Niezbyt często występujące działania niepożądane** (mniej niż u 1 na 100 osób): ból brzucha, nudności, niestrawność; bóle głowy; pokrzywka, świąd.
- **Rzadko występujące działania niepożądane** (mniej niż u 1 na 1 000 pacjentów): biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, zmęczenie, szumy uszne; pobudzenie, drażliwość, depresja, reakcje psychiatryczne; obrzęki.
- **Bardzo rzadko występujące działania niepożądane** (u mniej niż 1 na 10 000 osób): choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (spowodowane przedziurawieniem ściany żołądka lub jelita) czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku; wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; nasilenie objawów zapalenia jelita grubego i choroby Crohna; nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca; niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych; zmniejszenie ilości wydalanego moczu; zwiększenie stężenia sodu we krwi (powoduje obrzęki); zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania leku, znaczne zmniejszenie liczby wszystkich krwinek (anemia, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami są: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, znaczne wyczerpanie, krwawienia z nosa lub wylewy podskórne; rumień wielopostaciowy (sino - czerwone plamy na skórze, niekiedy z pęcherzami); toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, występowanie na skórze i (lub) błonach śluzowych pęcherzy, które po pęknięciu tworzą bolesne rany, często równocześnie występuje gorączka, ból mięśni i stawów (jest to tzw. zespół Stevensa-Johnsona); złuszczenie się dużych powierzchni naskórka i jego martwica; toczeń rumieniowaty układowy (przewlekła choroba spowodowana zaburzeniami układu odpornościowego, obejmująca wiele narządów); mieszana choroba tkanki łącznej; sztywność karku, bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, zaburzenia orientacji (są to objawy jałowego zapalenia opon mózgowych); ciężkie reakcje nadwrażliwości: obrzęk twarzy, języka i krtani utrudniający oddychanie, mówienie lub przełykanie, duszność, przyspieszone tętno, zmniejszenie ciśnienia krwi lub wstrząs, nasilenie objawów astmy.

Częstość nieznana: ciężkie reakcje skórne (zespół DRESS).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Ibuprex Max może wchodzić w interakcje z:

- lekami przeciwzakrzepowymi (warfayna, kwas acetylosalicylowy, tyklopidyna),
- lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitory ACE, beta-adrenolityki, antagoniści receptora angiotensyny II),
- innymi NLPZ,
- digoksyną
- kortykosteroidami,
- lekami przeciwplatekcyjnymi,
- fenytoiną,
- selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),
- litem,
- probencydem, sulfinpyrazonem,
- lekami [rzeciwnadciśnieniowymi, lekami moczopędnymi, lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas,
- metotreksatem,

- takrolimusem, cyklosporyną,
- zywudyną,
- pochodnymi sulfonilomocznika,
- antybiotykami z grupy chinolonów,
- antybiotykami aminoglikozydowymi,
- cholestyraminą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli występuje lub występowała: choroba jelita grubego, zaburzenia czynności nerek, wątroby, po dużych zabiegach chirurgicznych, obniżona krzepliwość krwi, polipy nosa, przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddechowe, choroby serca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, podwyższony poziom cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca albo udar.
- Należy poinformować lekarza jeśli pacjent pali tytoń.
- Przyjmowanie leków przeciwzapalnych lub przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.
- Nie należy stosować leku podczas ospy.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

- W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie zaleca się stosowania leku. Nie należy stosować leku u kobiet w III trymestrze ciąży, ponieważ mogłoby to zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań u matki i dziecka w okresie okołoporodowym.

Karmienie piersią:

- Ibuprofen przenika do mleka matki, ale może być stosowany podczas karmienia piersią, jeśli jest to najmniejsza możliwa dawka przez najkrótszy czas

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na płodność:

- Ibuprex Max, jak inne NLPZ może wpływać niekorzystnie na płodność, ale efekt ten jest przemijający i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Olimp Laboratories Sp. z o.o., Pustynia 84F, 39-200 Dębica

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.