

Ibuprom EFFECT żel 60g przeciwbólowy, przeciwzapalny



Cena: 25,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Substancja czynna	Ibuprofenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ibuprom Effect, 50 mg/g, żel, 60g

Przeciwbólowy i przeciwzapalny

Opis produktu:

- Ibuprom Effect żel to przeciwzapalny i przeciwbólowy lek przeznaczony do miejscowego stosowania na skórę. Zawiera ibuprofen - substancję czynną, która działa na zmiany zapalne w tkance, przyczyniając się do hamowania syntezy prostaglandyn. Ibuprofen zaliczany jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
- Żel Ibuprom wcieraany miejscowo w skórę leczy bóle mięśni oraz bóle występujące w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów obwodowych i kręgosłupa. Może być również stosowany w leczeniu zmian powypadkowych lub pourazowych związanych z uprawianiem sportu (np. stłuczeń, skręceń), zmian zapalnych tkanek okołostawowych oraz w leczeniu bolesnej sztywności barku i bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa.

Skład:

100 g żelu zawiera:

- substancję czynną: ibuprofenu 5 g,
- substancje pomocnicze: etanol 96%, alkohol izopropylowy, hydroksyetyloceluloza, lewomentol, aromat Reflex 12122 (metylusalicylan), glikolu dietylenowego monoetylowy eter, makroglicerydów kaprylokaproniany (Makrogol 400), glicerol, sodu wodorotlenek (10% roztwór wodny), woda oczyszczona.

Dawkowanie:

- Lek Ibuprom Effect należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Lek stosuje się miejscowo, na skórę. Zazwyczaj stosuje się pasek żelu o długości 4-10 cm (2-5 g żelu, co odpowiada 100 mg do 250 mg ibuprofenu) 3-4 razy na dobę, chyba że lekarz zalecił inaczej. W razie potrzeby lek można stosować częściej jednak nie częściej niż co 4 godziny, pamiętając, by nie przekraczać dawki 12 g żelu (600 mg ibuprofenu) na dobę.
- Czas stosowania leku określa lekarz. Jeżeli po upływie 10 dni leczenia objawy nie ustąpią lub się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem. Nie należy stosować leku pod opatrunkiem okluzyjnym. Podczas zabiegów jonoforezy (specjalna forma elektroterapii) wchłanianie substancji czynnych przez skórę jest zwiększone. Lek Ibuprom żel stosuje się pod katodą (pole ujemne). Zazwyczaj stosowane natężenie wynosi 0,1 do 0,5 mA na 5 cm² powierzchni elektrody, a czas trwania zabiegu wynosi maksymalnie 15 minut.

Wskazania:

- Miejscowe leczenie bólów mięśni.
- Leczenie bólów w przebiegu zwyrodnieniowych chorób stawów, reumatycznych schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa.
- Leczenie zmian zapalnych tkanek okołostawowych (np. kaletek maziowych, ścięgien, pochewek ścięgniastych, więzadeł i torebek stawowych).
- Leczenie bolesnej sztywności barku, bólów okolicy lędźwiowej kręgosłupa, zmian pourazowych związanych z uprawianiem sportu lub powypadkowych (np. stłuczeń, skręceń).

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Przeciwwskazania:

- uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku,
- nadwrażliwość (uczulenie) na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
- jeżeli po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ u pacjenta wystąpiły w przeszłości: pokrzywka, alergiczne zapalenie błon śluzowych nosa lub astma.

Działania niepożądane:

Lek ten, jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, co nie oznacza, że u każdego one wystąpią.

- Jeśli wystąpią poniższe objawy, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zwrócić się do lekarza:

niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne, wstrząs, astma, pogorszenie stanu astmatycznego, skurcz oskrzeli lub duszność.

Podczas długotrwałego leczenia mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Bardzo rzadko (do 1 na 10 000 osób) występują działania niepożądane:

- zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie, mrowienie w miejscu podania),
- wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, obrzęk naczyniowy, plamica,
- choroby pęcherzowe skóry (martwica naskórka, rumień wielopostaciowy),
- niewydolność nerek u pacjentów z chorobami nerek,
- ból brzucha, niestrawność.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Rozpoczęcie stosowania leku Ibuprom Effect żel należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

- Leku Ibuprom Effect żel nie należy stosować na otwarte rany, błony śluzowe i w okolicę oczu.
- Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, niewydolnością nerek, astmą oskrzelową i nietolerancją kwasu acetylosalicylowego, ibuprofenu lub innych NLPZ przyjmowanych doustnie.
- W trakcie stosowania leku Ibuprom Sport żel należy unikać wystawiania leczonej powierzchni ciała na działanie promieni słonecznych, gdyż grozi to wystąpieniem reakcji nadwrażliwości na światło (fotouczulenia).
- Jeśli u pacjenta wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie leku.
- Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, to po każdorazowym wsmarowaniu leku należy umyć ręce.

Dzieci i młodzież:

- Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci poniżej 14 roku życia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, przed zastosowaniem leku Ibuprom Sport żel powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
- W I i II trymestrze nie należy stosować leku na większe powierzchnie skóry i przez dłuższy czas.
- W III trymestrze ciąży stosowanie leku Ibuprom Sport żel jest przeciwwskazane.
- Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

- Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

- Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Leku Ibuprom Sport żel nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Interakcje:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent zamierza stosować.

- Dotychczas nie odnotowano wzajemnego oddziaływania ibuprofenu miejscowo stosowanego z innymi lekami.
- Jednoczesne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zwiększyć częstość występowania objawów niepożądanych.

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o., ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.