

Iladian direct plus, 10 tabletek dopochwowych



Cena: 19,59 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób medyczny

Iladian direct plus, na infekcje intymne - 10 tabletek dopochwowych

Preparat stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.

Składniki:

Kwas L-askorbinowy, inulina, witamina E, kwas hialuronowy.

Pozostałe składniki: laktoza, stearynian magnezu.

Wskazania:

- Pomocniczo w leczeniu bakteryjnego zapalenia pochwy,
- W łagodzeniu dolegliwości takich jak suchość i uczucie napięcia błony śluzowej pochwy,
- W trakcie i po zakończeniu stosowania doustnych antybiotyków i preparatów przeciwbakteryjnych,
- W okresie okołomenopauzalnym (klimakterium),
- Kobietom uczęszczającym na basen, często podróżującym, korzystającym z jacuzzi, sauny i solarium.

Działanie:

- Ogranicza rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.
- Redukuje świąd, upławy i nieprzyjemny zapach.
- Odtwarza i utrzymuje fizjologiczne pH.
- Likwiduje napięcie i suchość błony śluzowej pochwy.
- Iladian direct plus może być stosowany profilaktycznie.
- Iladian direct plus **poprzez przywrócenie lub utrzymanie fizjologicznego pH** pochwy stwarza warunki hamujące rozwój bakterii odpowiedzialnych za wystąpienie bakteryjnego zapalenia pochwy oraz drożdżaków z rodzaju Candida.
- Dodatkowo zawarta w wyrobie **inulina** korzystnie wpływa na rozwój naturalnej flory bakteryjnej, która pełni istotną rolę w zapobieganiu namnażaniu się bakterii wywołujących infekcje w układzie moczowo - płciowym.
- Działanie Iladian direct plus zostało uzupełnione obecnością **kwasy hialuronowego i witaminy E**, które nawilżają błonę śluzową pochwy łagodząc świąd, suchość i uczucie napięcia oraz zmniejszając podatność na mikrourazy.

Dawkowanie:

- **Wspomaganie leczenia bakteryjnego zakażenia pochwy** - Stosować 1 tabletkę dopochwową raz dziennie (na noc) przez 7 do 10 dni. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.
- **Profilaktyka** - Stosować 1 tabletkę dopochwową dwa razy w tygodniu. Tabletkę należy umieścić głęboko w pochwie.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Uwagi:

- Tylko do stosowania dopochwowego.
- Przed aplikacją dokładnie umyć dłonie.
- Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilą się w trakcie stosowania Iladian direct plus lub będą się utrzymywać powyżej 7-10 dni.

Ważne:

- Wyrób medyczny - posiada certyfikat CE
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

