

Inhalol płyn do sporządzania inhalacji parowej, 10 g



Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Profarm
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Inhalol płyn do sporządzania inhalacji parowej - 10 g

Opis produktu:

Inhalol jest preparatem stanowiącym mieszaninę olejków eterycznych o zbliżonym działaniu farmakologicznym.

Skład:

Substancje czynne - olejek sosnowy (*Pini silvestris aetheroleum*), olejek tymiankowy (*Thymi aetheroleum*), olejek miętowy (*Menthae piperitae aetheroleum*), olejek terpentynowy (*Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro*).

1 g płynu zawiera:

- 0,1 g - olejku sosnowego,
- 0,1 g - olejku tymiankowego,
- 0,2 g - olejku miętowego,

- 0,6 g - olejku terpentynowego.

Wskazania:

- Preparat stosuje się pomocniczo, w postaci inhalacji wziewnej, w celu łagodzenia **dolegliwości górnych dróg oddechowych** takich jak katar i trudności w odkrztuszaniu gęstej wydzieliny.
- Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu

Działanie:

- Mieszanina olejków eterycznych poprawia komfort oddychania.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Inhalacja u dzieci powyżej 7 roku życia i dorosłych** - do naczynia z gorącą wodą dodać kilka kropli preparatu i wdychać powstające opary.

Inhalację można prowadzić dodając kilka kropli do gorącej kąpieli, lub za pomocą specjalnych urządzeń inhalacyjnych.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy nie stosować leku Inhalol:

- w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu
- w przypadku chorych na astmę, krztusiec,
- nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić:

- reakcje uczuleniowe skóry,
- podrażnienia błon śluzowych,
- nasilenie skurczu oskrzeli.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi, oczami, ustami i nosem.
- Nie stosować bezpośrednio na skórę w obrębie szyi, twarzy, nosa.
- W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych, podrażnienia błon śluzowych, nasilenia skurczu oskrzeli należy zaprzestać używanie produktu.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 7 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Interakcje:

Interakcje związane ze stosowaniem równocześnie innych leków o podobnym działaniu nie są znane.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

PPFK „Profarm” sp. z o.o., ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.