

# Intractum Hippocastani, wyciąg z kasztanowca, 100 ml



Cena: 15,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Phytopharm Kłęka
Substancja czynna	Aesculus hippocastanum
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Phytopharm Intractum Hippocastani, wyciąg ze świeżego niedojrzałego owocu kasztanowca - 100 ml

(Intractum Hippocastani 2,34g/2,5ml)

## Opis produktu:

Produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie w objawach przewlekłej niewydolności żylniej (jak obrzęki podudzi, kurcze łydek, świąd, bóle oraz „uczucie ciężkości nóg” i pomocniczo w zylakach. Skuteczność produktu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

## Skład:

- Substancję czynną leku stanowi etanolowy wyciąg ze świeżego niedojrzałego owocu kasztanowca – (Hippocastani fructus recentis intractum) (1:1).
- Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 96% (V/V).
- Zawartość etanolu w produkcie: 52-62% (V/V).

- Dawka jednorazowa leku (2,5 ml) zawiera 23 mg saponin trójterpenowych w przeliczeniu na escynę.

## Wskazania:

- Tradycyjnie stosowany w objawach przewlekłej niewydolności żyłnej (jak obrzęki podudzi, świąd, kurcze łydek, bóle oraz „uczuciu ciężkości nóg”).
- Pomocniczo w żylakach.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** 2,5 ml płynu należy rozcieńczyć w niewielkiej ilości wody, 3 razy dziennie.

Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po upływie 2 tygodni, należy zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Intractum Hippocastani Phytopharm jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

## Przeciwwskazania:

- 

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Przy stosowaniu wewnętrznym odnotowano zaburzenia żołądkowo-jelitowe, bóle i zawroty głowy oraz świąd i reakcje uczuleniowe. Częstotliwość występowania nie jest znana.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Dzieci i młodzież poniżej 18 lat:** lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
- W żylakach możliwe jest stosowanie po wcześniejszej konsultacji lekarskiej.
- Lek zawiera alkohol.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## Podmiot odpowiedzialny:

Phytopharm Klęka S.A., Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.