

Inventum Max, 50 mg syldenafil, dla mężczyzn, 4 tabletek



Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Aflofarm
Substancja czynna	Sildenafilum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Inventum Max 50 mg - 4 tabletki do rozgryzania i żucia

Opis produktu:

Inventum Max to lek w postaci tabletek do rozgryzania i żucia. Lek Inventum Max jest stosowany u dorosłych mężczyzn w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego. Przed użyciem należy przeczytać ulotkę i wykonać Test diagnostyczny.

Skład:

1 tabletkę do rozgryzania lub żucia zawiera:

- **substancję czynną:** syldenafil 50 mg (tworzącego się in situ z 70,24 mg cytrynianu syldenafilu),
- **pozostałe składniki:** polakrylin potasu, woda oczyszczona, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, aspartam, kroscarmeloza sodowa, aromat mięty pieprzowej, laktoza jednowodna, powidon K-30.

Wskazania:

Lek Inventum Max jest stosowany u dorosłych mężczyzn w wieku \geq 18 lat w leczeniu zaburzeń erekcji definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

Działanie:

Inventum Max zawiera substancję czynną – syldenafil, która należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Inventum Max niezbędna jest stymulacja seksualna.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeżeli pacjent przyjmował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka leku to 50 mg. W innym przypadku lek Inventum Max w dawce 50 mg należy stosować tylko wtedy, gdy pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie uzyskał wzrodu wystarczającego do odbycia stosunku (czyli nie odczuł pożądanego efektu). W sytuacji, gdy zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji pozwalającej odbycie stosunku seksualnego, nie należy stosować leku w dawce 50 mg.

- Lek należy przyjmować na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
- Tabletkę należy rozgryźć i żuć do momentu rozpuszczenia (nie trzeba popijać).
- Nie należy przyjmować leku częściej niż 1 raz na dobę.
- Inventum Max umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku, jest różny u różnych pacjentów i zwykle wynosi od 30 do 60 minut. W przypadku, gdy lek zostanie zażyty po obfitym posiłku, jego działanie może nastąpić później.
- Należy poradzić się lekarza, jeśli po zastosowaniu leku Inventum Max nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzrodu nie wystarcza do odbycia stosunku płciowego.
- Jeżeli problemy z osiągnięciem i/lub utrzymaniem wzrodu wystąpią ponownie, należy zwrócić się do lekarza w celu ustalenia przyczyny i ustalenia dalszego postępowania.
- W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.
- Zastosowanie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.
- Nie należy zażywać większej ilości tabletek, niż wskazano w ulotce dla pacjenta.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku Inventum Max jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania:

Leku nie należy stosować:

Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych jego składników;

Jeśli pacjent przyjmuje: azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu, tetraazotan pentaerytroli) lub leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina) lub lek przeciwniedokrwienny - nikorandyl, inne leki lub środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), riocyguat;

Jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężkie choroby serca takie jak:

- niestabilna choroba wieńcowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub

dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut);

- choroba niedokrwienna (objawiająca się bólem w klatce piersiowej podczas stosunku płciowego);
- zastoinowa niewydolność serca II, III, IV w klasie NYHA (objawiająca się brakiem tchu po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut);
- jeśli pacjent ma inne choroby serca takie jak: umiarkowana lub ciężka wada zastawkowa serca, kardiomiopatia przerostowa lub inna;
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;
- jeśli u pacjenta w ciągu ostatnich 6 miesięcy wystąpił udar, zawał serca lub zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca;
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze (w spoczynku poniżej 90/50 mmHg);
- jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze (w spoczynku powyżej 160/100 mmHg);
- jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa);
- jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego;
- jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzrodu, w tym z innymi lekami zawierającymi syldenadfil (np. Inventum, Viagra);
- jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem sydenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.
- u pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji;
- u kobiet oraz u osób poniżej 18 roku życia.

Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Inventum Max są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeżeli po przyjęciu leku u pacjenta wystąpią poniższe objawy, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i powiadomić lekarza lub zgłosić się do szpitala.:

- nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła;
- jeżeli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej, powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić. Nie należy przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;
- nadmiernie przedłużający się i czasem bolesny wzwód (utrzymujący się ponad 4 godziny);
- nagłe pogorszenie lub utrata wzroku;
- ciężkie reakcje skórne objawiające się ciężkim łuszczeniem się i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączka;
- napady padaczkowe lub drgawki;

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

- ból głowy.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność,
- widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia,
- uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- wymioty, wysypka skórna,
- podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze,
- bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach,
- suchość w jamie ustnej, zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawiające się katarą, kichaniem i zatkanym nosem),
- ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawiająca się zgagą),
- ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia, krwimocz.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

- omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
- krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie,
- zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek,
- niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódok wokół źródeł światła,
- rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białkówki oka,
- krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
- uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu sylденаfilu do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Inventum Max należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

- gdy u pacjenta występują choroby zwiększające ryzyko wystąpienia priapizmu (długotrwałego, bolesnego wzwodu) takie jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego) lub białaczka (choroba nowotworowa krwi);
- gdy u pacjenta występuje anatomiczne zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego (objawiająca się skrzywieniem prącia);
- gdy pacjent ma dolegliwości ze strony serca – w tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek jaki wiąże się z aktywnością seksualną;
- gdy pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia);
- gdy u pacjenta wystąpiło nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku - wówczas należy przerwać stosowanie leku Inventum Max i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeżeli pacjent ma zaburzenia czynności nerek powinien poinformować o tym lekarza i nie powinien stosować dawki wyższej niż 25 mg.

Stosowanie leku z jedzeniem, pićm oraz alkoholem:

- Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego (należy mieć na uwadze, że przyjmowanie leku wraz z obitym posiłkiem może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku).
- Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu (aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed jego zażyciem).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Lek Inventum Max nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Lek Inventum Max może powodować wystąpienie zaburzeń widzenia i zawrotów głowy. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

Lek zawiera aspartam:

Lek zawiera 4,3 mg aspartamu w każdej tabletkce.

Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (jest to rzadka choroba genetyczna, w której fenyloalanina gromadzi się w organizmie, z powodu jej nieprawidłowego wydalania).

Lek zawiera laktozę jednowodną:

Lek zawiera 140,92 mg laktozy jednowodnej w każdej tabletkce. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent przed przyjęciem leku Inventum Max powinien poradzić się lekarza.

Lek zawiera potas:

Lek zawiera 13,223 mg potasu w każdej tabletkce.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu na 1 tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od potasu”.

Lek zawiera sól:

Lek zawiera 0,848 mg sodu w każdej tabletkce.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 1 tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Aflofarm Farmacja Polska Spółka z o.o.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.