

Jasnum Comfort, globulki dopochwowe, menopauza, 10 globulki



Cena: 49,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	UPS Zdrowie
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób Medyczny

Jasnum Comfort, globulki dopochwowe - 10 sztuk

Opis produktu:

Globulki Jasnum comfort są przeznaczone dla kobiet w celu łagodzenia dyskomfortu, uczucia suchości oraz napięcia, świądu i pieczenia błon śluzowych pochwy. Stosowanie zapobiega uszkodzeniom nabłonka podczas aktywności ruchowej, stosunków płciowych lub badań ginekologicznych.

Skład:

1 globulka zawiera sól sodową kwasu hialuronowego, glikogen, kwas mlekowy, octan tokoferylu (witamina E), mleczan sodu, glicerydy półsyntetyczne

Przeznaczenie produktu:

Wyrób medyczny, Jasnum Comfort, przeznaczony jest w celu łagodzenia dyskomfortu i uczucia suchości śluzówki pochwy, które

wynikają z:

- zaniku błon śluzowych pochwy,
- niedoboru estrogenów,
- bolesności stosunków,
- długotrwałego stresu.

Wskazania:

Jasnum Comfort zapewnia nawilżenie:

- przy zmianach wywołanych stosowaniem leków hormonalnych,
- po porodzie,
- w okresie okołomenopauzalnym,
- po obtarciach i innych niewielkich urazach mechanicznych błon śluzowych pochwy,
- po zabiegach chirurgicznych i ginekologicznych,
- po chemioterapii, radioterapii, krioterapii,
- po zabiegach laserowych.

Działanie:

Po aplikacji Jasnum comfort dopochwowo, następuje wytworzenie nawilżającej powłoki ochronnej na błonach śluzowych, co chroni nabłonek pochwy przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wpływa na zmniejszenie dyskomfortu związanego z uczuciem suchości, napięcia, świądu oraz pieczenia błon śluzowych pochwy.

Jasnum comfort:

- nawilża, chroni i przywraca elastyczność błony śluzowej pochwy,
- przywraca fizjologiczne pH pochwy, co sprzyja utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej,
- redukuje nieprzyjemny zapach

Dawkowanie:

- Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, stosować 1 globulkę na noc przez 7 kolejnych dni.
- Następnie w celu utrzymania działania stosować 1 globulkę co 2-3 dni aż do ustąpienia objawów.
- Nie stosować wyrobu dłużej niż przez 30 dni.
- W przypadku pominięcia zastosowania globulki, nie stosować dawki podwójnej.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego!

Sposób użycia:

1. Przed aplikacją wyrobu dokładnie umyć ręce.
2. Z blistra wyjąć 1 globulkę poprzez oderwanie folii wzdłuż perforacji i rozchylenie listków folii.
3. Globulkę umieścić głęboko w pochwie.

Uwaga: W przypadku gdy konsystencja globulki jest zbyt miękka, przed wyjęciem z folii należy umieścić ją na kilka minut w lodówce, do momentu stwardnienia globulki.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
- Nie stosować ze środkami znieczulającymi miejscowo i innymi preparatami dopochwowymi, gdyż preparat może osłabiać lub opóźniać ich działanie.
- Nie stosować wraz z lateksowymi prezerwatywami i wkładkami antykoncepcyjnymi, ponieważ wyrób poprzez zawartość tłuszczów może ograniczać ich skuteczność.
- Nie odbywać stosunków płciowych bezpośrednio po aplikacji globulki.
- W ciąży i w trakcie karmienia stosować po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
- W przypadku ostrej infekcji pochwy stosować tylko po konsultacji z lekarzem.
- Nie stosować w czasie menstruacji.
- Unikać przypadkowego kontaktu wyrobu ze śluzówką oka, nosa lub ust.
- Wyrób przeznaczony wyłącznie do stosowania dopochwowego.
- Nie stosować w przypadku upływu terminu ważności.
- Nie stosować wyrobu w przypadku uszkodzenia blistra.
- Nie stosować ponownie raz zaaplikowanej globulki.

Działania niepożądane:

Jak każdy wyrób ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Ze względu na zawartość kwasu mlekowego mogą wystąpić nieznaczne reakcje skórne (łagodne pieczenie lub swędzenie), zwłaszcza przy dużej suchości pochwy. Objawy te mają charakter przejściowy i zwykle ustępują.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego wyrobu.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,

które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie:

- Przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Chronić przed światłem i źródłami ciepła.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.

Ważne:

- **To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.**
- Wyrób medyczny.
- Posiada oznakowanie CE 2274
- **Posiada deklarację zgodności UE.**
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.

Wytwórca:

Laboratoire L'ideal, Parisien Sp z o.o., ul. Ogrodowa 8, 32-064 Niegoszowice

Dystrybutor:

USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.