


# Jodyna, Spirituosa, roztwór na skórę 3%, do dezynfekcji skóry czy otarć naskórka. 20g



Cena: 5,93 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Farmnina
Substancja czynna	Iodi solutio spirituosa
Typ produktu	Preparat dezynfekcyjny

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Jodyna, roztwór na skórę 3% - 20 g

(Iodi solutio spirituosa)

## Opis produktu:

- Jodyna to lek w postaci 3% roztworu na skórę o działaniu odkażającym. Produkt leczniczy stosuje się zewnętrznie, do dezynfekcji skóry czy otarć naskórka.

## Skład:

Produkt zawiera:

- Iodum 3,00 g
- Potasu jodek 1,00 g

- Etanol 96% 90,00 g

- Woda oczyszczona 6,00 g

## Wskazania:

- Zewnętrznie w niewielkich uszkodzeniach skóry, takich jak otarcia, zadrapania oraz w celu odkażenia nieuszkodzonej skóry, np. przed zabiegami.

## Działanie:

- Jodyna wykazuje działanie odkażające.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Otarte miejsca i bezpośrednie okolice ran przemywać 2-3 razy dziennie wacikiem nasączonym lekiem. Nie stosować na otwarte rany.

## Przeciwwskazania:

- Odczyny alergiczne na jod, ciąża, laktacja.
- Dzieci w wieku noworodkowym i niemowlęcym, nietolerancja glutenu (choroba Duhringa).

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Miejscowe odczyny alergiczne.
- Przy stosowaniu na duże powierzchnie może wystąpić obrzęk skóry, wykwity o charakterze trądziku.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na etykiecie, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
- Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Chronić oczy.
- Ostrożnie przy przerwaniu ciągłości skóry, chorobach tarczycy.
- Nie stosować na duże powierzchnie ciała.

### Ciąża i karmienie piersią:

- O stosowaniu leku w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Może zaburzać badania czynności tarczycy, nie stosować ze związkami rtęci.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić od światła.

## Podmiot odpowiedzialny:

Farmina sp. z o.o., Leśna 42, Osielsko

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.