

Juvit C , witamina C, w kroplach, 40 ml



Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Acidum ascorbicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Juvit C 100 mg/ml, krople doustne - 40 ml

(Acidum ascorbicum)

Opis:

Krople doustne Juvit C to lek uzupełniający codzienną dietę w witaminę C. Lek podaje się w leczeniu, ale również w profilaktyce niedoborów witaminy C i chorób z tym związanych, jak szkorbut. Juvit C można podawać m.in. niemowlętom karmionym sztucznie. Produkt leczniczy dedykowany dzieciom.

Skład:

Substancją czynną kwas askorbowy (witamina C).

substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona.

1 ml kropli doustnych zawiera 100 mg witaminy C.

Wskazania:

Krople doustne Juvit C przeznaczone są do leczenia stanów niedoboru witaminy C i profilaktyki chorób wywołanych niedoborem witaminy C, przede wszystkim szkorbutu oraz jego wstępnych objawów, choroby Moellera-Barlowa, w okresie rekonwalescencji, przy stosowaniu diety ubogiej w witaminę C, zwłaszcza u niemowląt karmionych sztucznie.

Działanie:

- Witamina C bierze udział w metabolicznych procesach utleniania i redukcji zachodzących w komórkach np. w procesie oddychania komórkowego.
- Jest niezbędna do tworzenia kolagenu, elastyny i substancji międzykomórkowej, a tym samym do prawidłowego rozwoju chrząstki, kości, zębów, gojenia ran, zwiększa elastyczność naczyń włosowatych.
- Wpływa na tworzenie ciał odpornościowych w organizmie (uważa się, że bierze udział w wytwarzaniu immunoglobulin i interferonu) oraz ułatwia wchłanianie żelaza w jelitach. Jest niezbędna do syntezy steroidów nadnerczy, katecholamin, insuliny oraz bierze udział w przemianie aminokwasów aromatycznych i metabolizmie tyroksyny.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, dawkowanie Juvitu C zależy od wieku pacjenta.

- **Wiek:** Dawkowanie
- **Niemowlęta i małe dzieci (od 28 dnia życia do końca 24 miesiąca życia):** 5-8 kropli raz na dobę dodane do pokarmu lub napoju
- **Dzieci od 3 roku życia do 11.:** 10 kropli dziennie
- **Młodzież od 12 roku życia oraz dorośli:** 15-20 kropli raz na dobę (w razie większego zapotrzebowania i w niedoborach dawkę można podwoić i przyjmować dwa razy na dobę)

Lek może być dodany do pokarmu lub napoju.

1 ml leku odpowiada około 20 kroplom.

Z uwagi na ryzyko przedawkowania nie należy podawać leku bezpośrednio z butelki do ust dziecka.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować leku Juvit C u pacjentów uczulonych na kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz u osób z szczawianową kamicą nerkową.
- Nie podawać wysokich dawek osobom z nadmiernym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Witamina C zazwyczaj jest dobrze tolerowana. Duże dawki, zwłaszcza stosowane długotrwale, mogą niekiedy powodować bóle głowy, zaczerwienienie skóry, działać moczopędnie, a także prowadzić do odkładania się kryształów szczawianu wapnia i

moczanów w drogach moczowych.

- Obserwowano także po odstawieniu rozwój tolerancji z objawami niedoboru po odstawieniu (szkorbut), a nawet uzależnienie, z bólami głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Valused należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej, lek może powodować hemolizę krwinek czerwonych.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie® wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Juvit C może wchodzić w interakcje z:

- sulfonamidami,
- żelazem,
- paracetamolem,
- glikozydami flawinowymi;
- może wpływać na wzrost stężenia stosowanych jednocześnie estrogenów w surowicy krwi,
- tetracyklinami,
- doustnymi środkami antykoncepcyjnymi,
- barbituranami,
- dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego.

Ciąża i karmienie piersią:

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

- Lek może być stosowany w ciąży oraz w czasie karmienia piersią, należy jednak zachować ostrożność przy wysokich dawkach leku (nie przekraczać zalecanych dawek) ze względu na ryzyko wystąpienia niedoboru witaminy C u dziecka.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Juvit C można podawać niemowlętom od 28 dnia życia

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Niemowlętom i małym dzieciom można podawać lek dodany do pokarmu lub napoju.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu, chronić przed światłem,
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e Wrocław

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.