

Ketoangin 1 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór, 15 ml



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Adamed
Substancja czynna	Ketoprofenum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Ketoangin 1 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór, 15 ml

(Ketoprofenum)

Ketoangin 1 mg/ml to aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. **Przeznaczony jest do objawowego leczenia zapalenia gardła, zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, a także stanów zapalnych i podrażnienia po ekstrakcji zęba (potocznie nazywanej wyrwaniem zęba) i po zabiegach stomatologii zachowawczej.**

Aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle Ketoangin przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wskazania:

- Leczenie objawowe stanów zapalnych i podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła z towarzyszącym bólem (np. zapalenie dziąseł, zapalenie jamy ustnej, zapalenie gardła), powstałych.
- Także w wyniku zabiegów stomatologicznych: zachowawczych lub obejmujących ekstrakcję (usunięcie zęba).

Skład:

1 ml aerozolu zawiera:

- **substancje czynne:** ketoprofen 1 mg, co odpowiada 1,6 mg ketoprofenu z lizyną;
- **pozostałe składniki:** glicerol 85%, ksylitol, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, jednozasadowy sodu fosforan jednowodny, poloksamer, aromat miętowy 987201/T13 (etanol, olejek z mięty pieprzowej, olejek z mięty polnej, mentol), woda oczyszczona.

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** 1–2 dawki leku do 3 razy na dobę.
- Pojedyncza dawka rozpylona zawiera około 0,2 ml roztworu, co odpowiada 0,32 mg ketoprofenu z lizyną (0,2 mg ketoprofenu).
- Nie przekraczaj zalecanej dawki.

Instrukcja użycia:

- Unieś butelkę i włóż aplikator do ust.
- Nakieruj strumień aerozolu bezpośrednio na zmienione chorobowo miejsce.
- Naciśnij dozownik, żeby umożliwić uwolnienie leku.

Stosuj najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli w ciągu 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:

Leku Ketoangin nie należy stosować jeżeli:

- pacjent ma uczulenie na ketoprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- u pacjenta występowało schorzenie układu oddechowego zwane: astmą oskrzelową;
- u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), powodując: napady astmy, trudności w oddychaniu w wyniku tymczasowego zwężenia oskrzeli (skurcz oskrzeli) lub obecność guzków w nosie (polipy w jamie nosowej), przeziębienie (ostry nieżyt nosa), reakcje alergiczne skóry, takie jak: pokrzywka lub obrzęk twarzy wokół oczu i ust, języka (obrzęk naczynioruchowy);
- pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- podrażnienie gardła;
- objawy alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust i oczu, języka lub gardła (obrzęk naczynioruchowy); dochodzi do niego zwłaszcza u osób uczulonych na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie tego produktu leczniczego, zwłaszcza długotrwałe, może prowadzić do zjawiska uczulania (zwiększonej odpowiedzi na kolejne podania tej samej dawki leku) bądź miejscowego podrażnienia. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem, który ustali odpowiednie leczenie.
- Nie należy stosować tego leku długotrwałe.
- Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę rozpyloną, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.
- Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan. Ketoangin może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Zakażenia:

- Należy poinformować farmaceutę lub lekarza, jeżeli u pacjenta występuje zakażenie.
- Lek Ketoangin może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym lek może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- Nie należy stosować leku u osób poniżej 18 roku życia.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Nie należy stosować leku Ketoangin w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- Brak danych dotyczących wpływu leku Ketoangin na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 30°C.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Lek zużyć w ciągu 21 tygodni od pierwszego otwarcia butelki. Lek nieużyty należy usunąć.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A., Pierzków, ul. M. Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnów.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.