

Kreon Travix 10 000j., enzymy trawienne, 50 kapsułek Delfarma



Cena: 58,90 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Abbott
Substancja czynna	Pancreatinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Kreon Travix 10 000j. 50 kapsułek dojelitowych, import Delfarma

(Pancreatinum)

Opis produktu:

Kreon Travix to produkt leczniczy zawierający mieszaninę enzymów trawiennych wskazany w zaburzeniach trawienia.

Skład:

Substancje czynne: pankreatyna (Pancreatinum) o aktywności:

10000 j. Ph.Eur. lipazy, 8000 j. Ph.Eur. amylazy, 600 j. Ph.Eur. proteazy.

Substancje pomocnicze - makrogol 4000, hypromelozy ftalan, dimetykon 1000, alkohol cetylowy, trietylu cytrynian.

Skład 1 kapsułki żelatynowej: żelatyna, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), tytanu

dwutlenek (E 171), sodu laurylosiarczan.

Wskazania:

Leczenie zaburzeń trawienia w przebiegu zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki u dzieci, młodzieży i dorosłych, której wystąpienie jest związane z poniżej wymienionymi lub innymi jednostkami chorobowymi:

- zwłóknienie torbielowate (mukowiscydoza)
- przewlekłe zapalenie trzustki
- stan po usunięciu trzustki (pankreatektomia)
- stan po usunięciu żołądka (gastrektomia)
- rak trzustki
- stan po zespoleniu żołądkowo-jelitowym (np. gastroenterostomia typu Billroth II)
- zwężenie przewodu trzustkowego lub przewodu żółciowego wspólnego (np. z powodu nowotworu)
- zespół Shwachmana-Diamonda
- stan po ataku ostrego zapalenia trzustki i rozpoczęciu żywienia dojelitowego lub doustnego.

Działanie:

- **Kreon Travix** wykazuje działanie lipolityczne, amylolityczne, proteolityczne - umożliwia trawienie tłuszczu, skrobi i białek. Lek zawiera mieszaninę enzymów trawiennych - pomaga trawić pokarm.
- Stosowanie leku zmniejsza objawy związane z zaburzeniem wydzielania enzymów trawiennych przez trzustkę (ból brzucha, wzdęcia, częstość wypróżnień).

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: od 2 do 8 kapsułek na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja). W przypadku przekąsek: 1-4 kapsułki (połowa dawki przyjmowanej dla posiłków głównych).

- Lek do stosowania doustnego.
- Dawka leku jest uzależniona od rodzaju schorzenia, masy ciała pacjenta, stosowanej diety.
- Kapsułek nie należy otwierać, gryźć, rzuć.
- Podczas stosowania należy pić znaczne ilości płynów w ciągu dnia.
- Lek stosować po głównych posiłkach lub podczas.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Nie należy stosować **Kreon Travix** :

- jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę wieprzową lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (u 1 lub częściej na 10 osób):

- bóle brzucha.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- nudności, wymioty,
- zaparcia, biegunka,
- wzdęcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- wysypka.

Częstość nieznaną:

- pokrzywka, świąd,
- reakcje nadwrażliwości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować ostrożność jeśli lek podawany jest dzieciom z mukowiscydozą przyjmującym duże dawki enzymów, ponieważ w rzadkich przypadkach zanotowano u tych dzieci zwężenie jelita.

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Kreon Travix może być stosowany w okresie karmienia piersią

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem

Lek należy przyjmować podczas posiłku lub zaraz po posiłku

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Przechowywać butelki szczelnie zamknięte.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.

Import równoległy:

Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź.

Podmiot odpowiedzialny na Łotwie w kraju eksportu:

Viatris Healthcare Limited Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Dublin, Irlandia.

Wytwórca:

Abbot Laboratories GmbH Justus-von-Liebig-Str.33 31535 Neustadt, Niemcy.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.