

# Labofarm, tabletki, przeciw, niestrawności, wzdęcia, 90tabletek



Cena: 26,49 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Labofarm
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

## Opis produktu

### Lek bez recepty

### Tabletki przeciw niestrawności - 90 sztuk

### (Productum compositum)

### Opis produktu:

Tabletki przeciw niestrawności to lek roślinny stosowany w dolegliwościach trawiennych, takich jak: uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego. Przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

### Skład:

- Substancją czynną jest - korzeń mniszka, owoc kminku, liść mięty pieprzowej, kora kruszyny, wyciąg suchy z ostropestu.
- Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, krzemionka koloidalna bezwodna.

Taraxaci radix (korzeń mniszka) - 100 mg; Carvi fructus (owoc kminku) - 50 mg; Menthae piperitae folium (liść mięty pieprzowej) - 60 mg; Frangulae cortex (kora kruszyny) - 60 mg; Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum (24-27:1) (rafinowany i standaryzowany wyciąg suchy z ostropestu) o zawartości 58%±10% sylimaryny w przeliczeniu na sylibininę (ekstrahent: aceton 95%) - 7 mg.

Jedna tabletkę zawiera 3,61-3,99 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

## Wskazania:

Tradycyjnie w dolegliwościach związanych z zaburzeniami procesu trawienia, takimi jak:

- uczucie pełności w żołądku, wzdęcia, zbyt małe wydzielanie żółci i soku żołądkowego.

- Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

## Działanie:

- Produkt pobudza wydzielanie soków trawiennych oraz żółci. Wykazuje łagodne działanie rozkurczające, wiatropędne.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dorośli i młodzież powyżej 12 roku życia: jednorazowo: 2 tabletki do 3 razy dziennie.
- Tabletki przyjmować po posiłku, popijając wodą. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 14 dni bez porozumienia z lekarzem.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku oraz w przypadku niedrożności jelit lub dróg żółciowych, bólów brzucha o nieustalonej etiologii, ostrych schorzeń zapalnych jelit, zapalenia wyrostka robaczkowego, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza.

- Mogą nasilić się objawy refluksu żołądkowo-przełykowego oraz zgagi.

- Mogą wystąpić reakcje alergiczne i nadwrażliwości, skurcz i ból brzucha, nadkwaśność, płynny stolec (w szczególności u pacjentów z zespołem jelita drażliwego). Takie objawy mogą również wskazywać na przedawkowanie produktu.
- Przewlekłe nadużywanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodnoelektrolitowej, białkomoczu, krwiomoczu oraz odkładania barwnika w błonie śluzowej jelita grubego (pseudomelanosis coli), które zwykle ustępuje po zakończeniu przyjmowania leku.
- Podczas leczenia może wystąpić żółte lub czerwono-bordowe (zależne od pH) zabarwienie moczu, które nie ma znaczenia klinicznego.

## Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Przewlekłe nadużywanie leku może prowadzić do niskiego stężenia potasu we krwi, co może nasilać działania równocześnie przyjmowanych glikozydów nasercowych, powodować interakcje z lekami przeciwartmicznymi.
- Równoczesne przyjmowanie leku z lekami powodującymi obniżenie stężenia potasu we krwi, np. lekami moczopędnymi, sterydami kory nadnerczy, korzeniem lukrecji, może pogłębić niedobór elektrolitów.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Produkt nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania.

- 

Decyzję o stosowaniu przez okres dłuższy niż 7-14 dni może podjąć lekarz.

- 

Należy unikać stosowania u pacjentów z niewydolnością nerek, cukrzycą, niewydolnością serca, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia potasu we krwi.

- 

Jeśli podczas stosowania wystąpią takie objawy jak gorączka, bolesne oddawanie moczu, skurcze lub krew w moczu, należy skonsultować się z lekarzem.

### Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

### Ciąża:

- Ze względu na brak danych nie jest zalecane stosowanie w ciąży.

**Karmienie piersią:**

- Z uwagi na możliwość przechodzenia niektórych składników do mleka, nie jest zalecane stosowanie w okresie karmienia piersią

**Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

**Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. Lubichowska 176 b 83-200 Starogard Gdański

**Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.